




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Erythrostin Move Plus



Water Soluble Powder Broad-spectrum antimicrobial for enteric and respiratory infections

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1gm per 2 Liter drinking water for 3-5 days

Calves: 1gm per 5 Kg of body weight for 3-5 days

INDICATIONS:

Erythrostin Move Plus has a wide spectrum of action against gram-positive bacteria and bacterial infections that cause inflammation of the trachea and nasal mucous membranes and to avoid infections of bacterial or viral respiratory infections.

It has high effectiveness in the treatment of chronic respiratory diseases, inflammatory cell membrane inflammation, infectious sinusitis and rhinitis.

It has high effectiveness during the treatment of enteritis and diarrhea in poultry, calves and lambs.

Contains a combination of Ambroxol as an expectorant and an antibiotic that works synergistically against mycoplasma and bacteria.

Aimed at reducing the number of deaths after vaccination and transportation.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Erythromycin thiocyanate 350 mg

Ambroxol HCl 10 mg

Colistin Sulfate 1,000,000 I.U

Complementary materials and

menthol up to 100%

WITHDRAWAL PERIOD:

3 days



500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

اپریٹروستین موفی بلص



Cow Poultry



Goat **Lamb**

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد بكتيري واسع الطيف للاصابات المعدوية والتنفسية

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن : ١ غرام لكل ٢ لتر ماء الشرب لمدة ٥-٣ أيام.
العجول : ١ غم لكل ٥ كغم من وزن الجسم لمدة ٥-٣ أيام.

التركيبة :

ابيرثرو مابيسين ثيوسيانيت ٣٥٠ ملغم
امبروكسول هايدرووكورايد ١٠ ملغم
كوليستين سلفيت ١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة دولية
مود مكممة، ومنثا، لغالية ١٠٪

الخاص ، العلاجية والاستطبابات.

أييرثروستين موفي بلص لديه طيف واسع من العمل ضد البكتيريا بموجة الجرام والبكتيرية المسببة لالتهابات القصبة الهوائية والأغشية المخاطية الأنفية ولتجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسى البكتيرية أو الفيروسية.
لديه فعالية عالية في علاج أمراض الجهاز التنفسى المرتبطة بالتهاب الغشاء الخلوي المعدية ، التهاب الجيوب الأنفية المعدية والتهاب الأنف.
له فعالية خلال علاج التهاب الأمعاء والإسهال في المواجه والعجلون والحملان.

ويحتوي على مزيج من الأمبروكسول كمفعن و مضادات حيوية يعمل بشكل تنازلي ضد الميكوبلازما والبكتيريا.
ويهدف إلى تقليل عدد الوفيات بعد التطعيم والنفف.

فتره السحب : ٣ أيام



۱۰۰

(أقل من ٣٠ درجة مئوية)