



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Bromotryl



Oral Solution - Broad Spectrum Antibiotic

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml/ 2 liters of drinking water for 3-5 days
Calves, Goats and Sheep: 0.3 – 0.5 ml/ 10 kg of body weight for 3-5 days.
Cats and Dogs: dilute 1 ml in 100 ml of drinking water then give 2.5 ml of the diluted solution every 12 hours for 3 days

INDICATIONS:

Bromotryl kills a wide range of Gram-negative bacteria, including E. coli, Salmonella, Klebsiella, Haemophilus, Pasteurella, and Pseudomonas, as well as Gram-positive bacteria, such as Staphylococcus aureus, Clostridia, Streptococcus, Chlamydia, and Mycoplasma, which affect the respiratory, digestive, and reproductive systems. Bromotryl contains Bromhexine, which enhances its effect by relieving congestion in the upper respiratory tract, dissolving, and expelling mucous secretions.

COMPOSITION:

Each 1 liter contains
Enrofloxacin 100 mg
Bromhexine Hydrochloride 10 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

7 days.



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

بروموتريل



محلول فموي - مضاد حيوي واسع الطيف

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ مل لكل ٢ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام
العجول، الماعز، والأغنام: ٠,٣ - ٠,٥ مل لكل ١٠ كجم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام
القطط والكلاب: يتم تخفيف ١ مل في ١٠٠ مل من مياه الشرب، ثم يتم إعطاء ٢,٥ مل من المحلول المخفف كل ١٢ ساعة لمدة ٣ أيام

الخواص العلاجية والإستطبابات:

بروموتريل يقضي على مجموعة واسعة من البكتيريا سالبة الجرام، والتي تشمل الإشريكية القولونية (E. coli)، السالمونيلا، الكليبيلا، الهيموفيلوس، الباستوريلا، والزائفة (Pseudomonas)، بالإضافة إلى البكتيريا موجبة الجرام، مثل المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus)، الكلوستريديا، العقديية (Streptococcus)، الكلاميديا، والميكوبلازما التي تؤثر على الجهاز التنفسي والهضمي والتناسلي. يحتوي بروموتريل على برومهيكسين، الذي يعزز تأثيره من خلال إزالة الاحتقان في الجهاز التنفسي العلوي، وإذابة الإفرازات المخاطية وطردها.

التركيبية :

يحتوي كل ١ لتر على:

إنروفلوكساسين ١٠٠ مجم
برومهيكسين هيدروكلوريد ١٠ مجم

فترة السحب :

٧ أيام.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)