



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

MOVE - fenbendazole 100



> Cow



Goat



Lamb

>



Horse



Camel

Oral Suspension - Broad Spectrum Antiparasitic

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Cattle: 1 ml per 13 kg of body weight orally (7.5mg per kg of body weight). If animal weighs over 400 kg, extra 3.75 ml is added for each additional 50 kg of body weight.

Sheep: 1 ml per 20 kg of body weight orally (5 mg per kg of body weight). If animal weighs over 80 kg, extra 0.5 ml is added for each additional 10 kg bw.

Horses: 1-Single Dose Treatment for Horses

• In case of Encysted small strongyles (mucosal stage): 3ml per 10 kg of body weight (30mg per kg of body weight).

• In case of migrating and tissue large strongyles: 6 ml per 10 kg of body weight (60 mg per kg of body weight).

• In case of diarrhea in 2-3 weeks old sucking foals (Strongyloides westeri): 5ml per 10kg bw (50mg per kg bw). Repeat every 6-8 weeks.

2-Five-day course for horses

• In case of migrating Strongylus larvae and cysts: 5 ml per 64 kg bw daily for 5 days (7.5 mg per kg bw).

PRECAUTIONS:

Do not mix with other products.

INDICATIONS:

For the treatment and control of Roundworms, Lungworms and Tapeworms in Cattle & Sheep. And Roundworms and Tapeworms in Horses.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

Fenbendazole 100 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: Cattle – 12 days, Sheep – 15 days

Milk: Cattle - 5 days, Sheep – 7 days



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي - فينبندازول ١٠٠



> Cow



Goat



Lamb

>



Horse



Camel

Pharmaceutical

معلق للشرب - مضاد طفيلي واسع الطيف

التركيبة :

كل ١ مل يحتوي :
فينبندازول

١٠٠ ملغم

فترة السحب :

لحم الأبقار: ١٢ يوم
لحم الأغنام: ١٥ يوم
ألبان الأبقار: ٥ أيام
ألبان الأغنام: ٧ أيام

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الأبقار: ١ مل لكل ١٣ كجم من وزن الجسم عن طريق الفم (٧,٥ ملجم لكل كجم من وزن الجسم) وإذا كان وزن الحيوان فوق ٤٠٠ كجم يتم إضافة ٣,٧٥ مل لكل ٥٠ كجم إضافية.
الأغنام: ١ مل لكل ٢٠ كجم من وزن الجسم عن طريق الفم (٥ ملجم لكل كجم من وزن الجسم) وإذا كان وزن الحيوان أكثر من ٨٠ كجم يتم إضافة ٠,٥ مل لكل ١٠ كجم إضافية.
الخيول: ١- العلاج بجرعة واحدة للخيول:
- في حالة ديدان الإسترونجيلس الصغيرة (الطور المتوصل في الأغشية المخاطية) ٣ مل لكل ١٠ كجم من وزن الجسم
٣٠ ملجم لكل كجم من وزن الجسم
- في حالة الأطوار المهاجرة لنديدان الإسترونجيلس الكبيرة ٦ مل لكل ١٠ كجم من وزن الجسم (٦٠ ملجم لكل كجم من وزن الجسم)
في حالات الإسهالات التي تسببها ديدان "الإسترونجيلس ويستري" في المهر الرضيع في أعمار ٢ إلى ٣ أسابيع يستخدم ٥ مل لكل ١٠ كجم من وزن الجسم (٥٠ ملجم لكل كجم من وزن الجسم) يكرر العلاج كل ٦ - ٨ أسابيع.
٢- برنامج علاجي لمدة خمسة أيام للخيول:
في حالات الأطوار المهاجرة والبرقات النسيجية لنديدان الإسترونجيلس والأطوار المتوصل: يستخدم ٥ مل لكل ٦٤ كجم من وزن الجسم يوميا لمدة خمسة أيام (٧,٥ ملجم لكل كجم من وزن الجسم)

الاحتياطات:

ينصح بعدم خلط المستحضر مع مستحضرات أخرى أثناء الاستخدام

الخواص العلاجية والإستطبابات:

للقاية والعلاج في حالات الديدان الأسطوانية، الرئوية و الشريطية في الأبقار والأغنام.
والديدان الأسطوانية و الشريطية في الخيول.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)