



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

LINCODERN



>



Cow

>



Goat



Lamb

Intramammary solution

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administered by Intramammary infusion only.
LINCODERN is given intramammary after a good milking of the affected quarter, applying the content of 10 ml syringe, with a light massage upwards. The treatment can be repeated on every 12 hours, for 3 to 4 days according to the evolution of the condition.

INDICATIONS:

LINCODERN is a broad spectrum antibiotic with action against gram positive and gram negative bacteria, for example (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus pyogenes), and gram negative for example (Escherichia coli, Klebsiella spp, Shigella spp, Pseudomonas spp, Salmonella spp, Mycoplasma spp.)
LINCODERN helps to alleviate the signs of edema, heat and pain in addition to allowing a better diffusion of the antibiotics through inflamed tissues, decreasing the recovery time.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

Lincomycin (as Lincomycin-HCl)	20.0 mg
Neomycin (as Neomycin sulphate)	20.0 mg
Dexamethasone	0.10 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Milk: 4 days from the last treatment.



10 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

لينكوديرن



>



Cow

>



Goat



Lamb

محلول الضرع

التركيبية :

كل ١ مل يحتوي :

لينكومايسين (كمادة لينكوميسين-هيدروكلوريد) ٢٠,٠ ملغ
نيومايسين (كمادة نيومايسين سلفات) ٢٠,٠ ملغ
ديكساميثازون ٠,١٠ ملغ

فترة السحب :

الحليب: ٤ أيام منذ آخر علاج.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

يُعطى عن طريق التسريب داخل الضرع فقط.
يتم إعطاء لينكوديرن داخل الضرع بعد حلب جيد للربع المصاب، وذلك بتطبيق
محتوى الحقنة ذات ١٠ مل مع تدليك خفيف للأعلى.
يمكن تكرار العلاج كل ١٢ ساعة لمدة ٣ إلى ٤ أيام وفقاً لتطور الحالة.

الخواص العلاجية والإستطابات:

لينكوديرن هو مضاد حيوي واسع الطيف ذو فعالية ضد البكتيريا موجبة الجرام
وسالبة الجرام، مثل المكورات العنقودية، والعقديات، والإشريكية القولونية،
والكلبسيلا، والشيفيلا، والزائفة، والسالمونيلا، والمايكوبلازما.

يساعد لينكوديرن في تخفيف أعراض الوذمة، والحرارة، والألم، بالإضافة إلى
تحسين انتشار المضادات الحيوية عبر الأنسجة الملتهبة، مما يقلل من وقت
التعافي.



١٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)