



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Floxy-col dern



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Broad Spectrum Antibiotic

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml / 4 liters of drinking water for 3-5 days.
Salmonellosis cases treatment should be for 5 days.
Calves and Lambs: 1 ml / 40 kg of body weight for 3-5 days.

INDICATIONS:

Floxy-col dern combines antibiotics with highly synergistic effects, targeting Mycoplasma and a broad spectrum of Gram-positive and Gram-negative bacteria.

It is used to treat respiratory, gastrointestinal, and urogenital tract infections caused by bacteria sensitive to Enrofloxacin and Colistin, including Mycoplasma, E. coli, Salmonella, Pasteurella, Haemophilus, Streptococci, and Staphylococci in poultry, calves, and lambs.

Floxy-col dern is effective against chronic respiratory disease (CRD), infectious coryza, air sacculitis, infectious sinusitis, infectious synovitis, yolk sac infections, and omphalitis.

It is also prescribed for necrotic and ulcerative enteritis, enterotoxemia, pulmonary pneumonia, and intestinal diarrhea in calves, poultry, and lambs.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Enrofloxacin 200 mg
Colistin Sulfate 1200000 IU

WITHDRAWAL PERIOD:

Poultry 4 days from the last dose.
Calves and lambs 7 days from the last dose.



1000 ml




(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

فلوكسي-كول ديرن



مضاد حيوي واسع الطيف

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ مل / ٤ لتر ماء شرب لمدة ٣-٥ أيام.
علاج حالات السالمونيلا لمدة ٥ أيام.
العجول والحملان: ١ مل / ٤٠ كجم وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يجمع فلوكسي-كول ديرن بين المضادات الحيوية ذات التأثيرات التآزرية العالية، مستهدفاً الميكوبلازما ومجموعة واسعة من البكتيريا موجبة وسالبة الجرام. يُستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي التي تسببها البكتيريا الحساسة لإنروفلوكساسين وكوليسيتين، بما في ذلك الميكوبلازما، والإشريكية القولونية، والسالمونيلا، والبستوريل، والهيموفيليس، والمكورات العقدية، والمكورات العنقودية في الدواجن، والعجول، والحملان. فلوكسي-كول ديرن فعال ضد مرض الجهاز التنفسي المزمن، الزكام المعدي، التهاب الأكياس الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية المعدي، التهاب المفاصل المعدي، التهابات كيس الصفار، والتهاب السرة. يُستخدم أيضاً لعلاج التهاب الأمعاء النخري والتقرحي، والتسمم المعوي، والالتهاب الرئوي، والإسهال المعوي في العجول، والدواجن، والحملان.

التركيبية :

يحتوي كل ١ مل على:
إنزوفلوكساسين ٢٠٠ ملغم
كوليسيتين سلفيت ١٢٠٠٠٠٠ وحدة دولية

فترة السحب :

الدواجن ٤ أيام من آخر جرعة.
العجول والحملان ٧ أيام من آخر جرعة



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)