



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Pharmaceutical

Tetradern 30%



>



Cow



Camel



Goat



Lamb

>



Horse



Poultry

Water soluble powder

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

- Given with water or feed.
 - Give single dose each time.
- Sheep, goats, cattle, camels: : 0.5 gm per 10 kg body weight in drinking water or mixed with feed.
- Repeat for prevention every 4-6 months.
- Poultry, Pigeons: 0.06 gm per kg body weight.
- Repeat every 3 months.

INDICATIONS:

For the treatment and control of parasitic gastro – enteritis and verminous bronchitis caused by round worms (Nematodes):

- Ruminants:
Gastro – intestinal worms: Ascaris, Nematodirus, Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichuris, Strongyloides.
- Lung worms: Dictyocaulus.
- Poultry: Ascaridia, Heterakis, Capillaria, Amidostomum..

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:
Tetramisole HCL 300 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

For meat and eggs consumption:
7 days.

For milk consumption: 1 day..



1000 g



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

تيتراديرن ٣٠٪



>



Cow



Camel



Goat



Lamb

>



Horse



Poultry

Pharmaceutical

بودرة ذوابة في الماء

الجرعات وطريقة الاستعمال :

• تيتراديرن ٣٠٪ هو مضاد للديدان واسع الطيف وقوي (مجموعة إيميدوثيازول) ضد الديدان الأسطوانية (الديدان المدورة) في الجهاز الهضمي وديدان الرئة لدى الحيوانات المجترة.

• تيتراديرن ٣٠٪ ضمن الجرعة العلاجية. آمن حتى للحيوانات الحوامل.

• يمارس التيتراديرن ٣٠٪ تأثيره المضاد للديدان عن طريق شل حركة الديدان الخطية.

يحدث الشلل بسبب تقلص العضلات المستمر مما يؤدي إلى شلل عصبي عضلي للطفيليات.

الخواص العلاجية والاستطبابات:

لعلاج والسيطرة على التهاب المعدة والأمعاء الطفيلي والتهاب الشعب الهوائية الناجم عن الديدان المدورة (الديدان الأسطوانية):

• الحيوانات المجترة:

الديدان المعوية-المعوية: الإسكارس، النيماتوديرس، هيمنوشوس، أوسترتاجيا، كوبريا، مسلكة شعرية الذيل، الأسطوانيات.

ديدان الرئة: شايكة الجذع.

• الدواجن: أسكاريدا، هيتيراكيس، كابيلاريا، أميدوستوم.

التركيبة :

كل ١ غم يحتوي على:
تيتراميزول هيدروكلورايد ٣٠٠ ملغم

فترة السحب :

• لاستهلاك اللحم و البيض: ٧ أيام
• لاستهلاك الحليب: ١ يوم



1000 جرام



(أقل من 30° درجة مئوية)