




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Pharmaceutical

PROGSTREEN



>



Cat



Dog

>

Oral Hormone Tablets for Dogs and Cats

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

For female cats:

To prevent oestrus – 1 tablet for 10-14 days. After discontinuation of the drug estrus occurs within 14 days.

To stop the oestrus – 1 tablet daily for 3-5 days (from the date of display signs of sexual arousal).

As a contraceptive – 3 tablets within days after mating.

For female dogs:

To prevent oestrus – 1 tablet per 10 kg of body weight once every 14 days. After discontinuation of the drug estrus occurs within 21 days.

To stop the oestrus – 1 tablet per 10 kg for 7 days (from the date of display signs of sexual arousal).

As a contraceptive – 2 tablets per 5 kg of body weight daily for 2 days after mating.

For cats:

For sedation during sexual arousal – 1 tablet daily for 3-5 days.

For dogs:

For sedation during sexual arousal – 1 tablet per 10 kg body weight daily for 5 days.

INDICATIONS:

PROGSTREEN oral tablet used for the postponement or prevention of oestrus and the treatment of false pregnancy and oestrogen-dependent mammary tumours in bitches.

PROGSTREEN for oestrus control and for the treatment of miliary eczema and eosinophilic granuloma (rodent ulcer) in cats.

PROGSTREEN for the treatment of behavioural abnormalities, such as hypersexuality in male dogs and urine spraying in cats.

COMPOSITION:

Each tablet contains:
Megestrol Acetate 5 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



100 tablets



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

بروجسترين



>



Cat

>



Dog

أقراص هرمونية فموية للكلاب والقطط

Pharmaceutical

الجرعات وطريقة الاستعمال :

للإناث من القطط:
• للوقاية من الشبق: قرص واحد يوميًا لمدة 10-14 يومًا. يحدث الشبق عادة بعد 14 يومًا من التوقف عن استخدام الدواء.
• لإيقاف الشبق: قرص واحد يوميًا لمدة 3-5 أيام (يبدأ عند ظهور علامات الإثارة الجنسية).
• كموانع للحمل: 3 أقراص تؤخذ خلال الأيام التي تلي التزاوج.
للإناث من الكلاب:
• للوقاية من الشبق: قرص واحد لكل 10 كجم من وزن الجسم مرة كل 14 يومًا. يحدث الشبق بعد حوالي 21 يومًا من التوقف عن استخدام الدواء.
• لإيقاف الشبق: قرص واحد لكل 10 كجم من وزن الجسم لمدة 7 أيام (يبدأ عند ظهور علامات الإثارة الجنسية).
• كموانع للحمل: قرصان لكل 5 كجم من وزن الجسم يوميًا لمدة يومين بعد التزاوج.
للقطط:
• للتسكين أثناء الإثارة الجنسية: قرص واحد يوميًا لمدة 3-5 أيام.
للكلاب:
• للتسكين أثناء الإثارة الجنسية: قرص واحد لكل 10 كجم من وزن الجسم يوميًا لمدة 5 أيام.

التركيبة :

كل حبة تحتوي على :
ميجيسترول أسيتات ٥ ملغ

فترة السحب :

لا يوجد

الخواص العلاجية والإستبائات:

بروغسترين يُستخدم لتأخير أو منع الشبق، وعلاج الحمل الكاذب وأورام الثدي المعتمدة على هرمون الإستروجين في إناث الكلاب.
بروغسترين يُستخدم بروغسترين أيضًا للتحكم في الشبق وعلاج الإكزيما الحبيبية والقرحة البوزينية (قرحة القوارض) في القطط.
بروغسترين يُستخدم لعلاج الاضطرابات السلوكية مثل فرط النشاط الجنسي في الكلاب الذكور ورش البول في القطط.



١٠٠ قرص



(أقل من 30° درجة مئوية)