



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Hepadern



Cow



Poultry



Goat



Lamb



Horse



Camel

Pharmaceutical

Oral Solution Stimulant for Liver and Kidney Functions Helps in Detoxification

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1-2 ml/Liter of drinking water for 5-7 days
Horses and Cattle: 20-50 ml/Liter of drinking water for 4-5 days
Goat and sheep: 5-10 ml/Liter of drinking water for 4-5 days

INDICATIONS:

Prevention of fatty liver syndrome (hepatic lipidosis), prevention of mycotoxicosis, stimulation of growth of chickens and chicks, increase the appetite and Feed Conversion Ratio.
Prevention of acute and chronic hepatitis, colic syndrome and gastrointestinal disorders. While using medications that affect the hepatic parenchyma and its performance (antibiotics, antiparasitic, anesthetics, sedative... etc) and after transportation.

COMPOSITION:

Each1 ml contains:

Silimarine and Artichoke extract dipped	310 mg
Methionine	100 mg
Lysine	20 mg
Sorbitol Solution	200 mg
Choline Chloride 70 %	75 mg
Betaine Hydrochloride	60 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

هيبادين



Cow



Poultry



Goat



Lamb



Horse



Camel

Pharmaceutical

سائل قموي منشط لوظائف الكبد والكلية ومساعد لإزالة السموم المتراكمة

التركيبة :

يحتوي كل ١ مل على:
منفوخ نبات الأرضي شوكة والسيلمارين ٣١٠ ملجم
ميتيونين ١٠٠ ملجم
ليسين ٢٠ ملجم
محلول سوربيتول ٢٠٠ ملجم
كلوريد الكولين ٧٠٪ ٧٥ ملجم
كلوريد البيتاين ٦٠ ملجم

فترة السحب :

لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١-٢ مل/لتر من مياه الشرب لمدة ٥-٧ أيام
الخيول والأبقار: ٢٠-٥٠ مل/لتر من مياه الشرب لمدة ٤-٥ أيام
الماعز والأغنام: ٥-١٠ مل/لتر من مياه الشرب لمدة ٤-٥ أيام

الخواص العلاجية والإستطابات:

الوقاية من متلازمة الكبد الدهني (تدهن الكبد)، الوقاية من التسمم الفطري، تحفيز نمو الدجاج والكتاكيت، زيادة الشهية ونسبة التحويل الغذائي.
الوقاية من التهاب الكبد الحاد والمزمن، متلازمة المغص واضطرابات الجهاز الهضمي.
أثناء استخدام الأدوية التي تؤثر على أنسجة الكبد وأدائها (المضادات الحيوية، مضادات الطفيليات، التخدير، المهدئات... إلخ) وبعد النقل.