




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Super farm



Premix – for animal consumption

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Mix in water or add to feed before giving it to the animal.
Poultry: 1 ml per liter of drinking water for 4-5 days.
Rabbits: 0.5 ml per liter of drinking water for 4-5 days.
Sheep and goats: 24 ml per animal in drinking water for 5 days.
Cows and camels: 75 ml per animal in drinking water for 5 days.
Cats and dogs: 12 ml per animal in drinking water for 4-5 days.
Bees: 2 ml per liter of sugar solution for 4-5 days.

INDICATIONS:

Stimulates immunity and protects the liver and kidneys.
Tonic for growth and production (meat, milk, and eggs).
Appetizing agent that strengthens the legs and beak.
Enhances kidney function and protects the liver from fat accumulation.
In poultry, it helps in increasing weight, improving feather growth speed, and enhancing the size and strength of the eggshell.
Compensates for vitamin and amino acid deficiencies in animals, birds, and bees.

COMPOSITION:

Each liter contains:
Vitamin A palmitate 20,000,000 IU, Vitamin D3 (Cholecalciferol-D3) 5,000,000 IU, Vitamin E (Acetate) 9 g, Vitamin B2 (Riboflavin) 10 g, Vitamin B1 (Thiamine) 5 g, Vitamin B6 (Pyridoxine) 5 g, Vitamin B12 (Cobalamin) 50 mg, Vitamin C (Ascorbic Acid 99%) 50 g, Vitamin K3 (Menadiolone Sodium Bisulfite) 1 g, Folic Acid 1 g, Vitamin B3 (Niacin) 20 g, Vitamin B5 (Pantothenic Acid) 10 g, Amino Acid Complex 20 g, Mannan-Oligosaccharide 20 g, Artichoke 20 g, Sorbitol 20 g, L-Carnitine 5 g, Citric Acid 5 g, Choline Chloride 1 g, Complementary materials up to 1 liter.

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml




(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

سوبر فارم



مخاليط إضافات علفية

الجرعات وطريقة الاستعمال :

خلط في الماء أو يُضاف إلى العلف قبل تقديمه للحيوان.
الدواجن: ١ مل لكل لتر من مياه الشرب لمدة ٤-٥ أيام.
الأرانب: ٥ مل لكل لتر من مياه الشرب لمدة ٤-٥ أيام.
الأغنام والماعز: ٢٤ مل لكل حيوان في مياه الشرب لمدة ٥ أيام.
الأبقار والإبل: ٧٥ مل لكل حيوان في مياه الشرب لمدة ٥ أيام.
القطط والكلاب: ١٢ مل لكل حيوان في مياه الشرب لمدة ٤-٥ أيام.
النحل: ٢ مل لكل لتر من محلول السكر لمدة ٤-٥ أيام.

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يحفز المناعة ويحمي الكبد والكلية، منشط للنمو والإنتاج (اللحم، الحليب، البيض)،
فاتح شهية يساعد في تقوية الساقين والمنقار، مقو لوظائف الكلية ويحمي الكبد من
الدهون. في الدواجن، يساعد في تحسين الوزن، سرعة تكوين الريش، وزيادة
حجم وقوة قشرة البيض. يغطي نقص الفيتامينات والأحماض الأمينية للحيوانات
والطيور والنحل.

التركيبية :

كل لتر يحتوي على:
فيتامين أ بالمليونات ٢٠٠٠٠٠٠٠ وحدة دولية، فيتامين د٣
(كوليكالسيفيرول-٣-٥٠٠٠٠٠٠ وحدة دولية، فيتامين هـ
(أسيتات) ٩ جم، فيتامين ب٦ (بيريدوكسين) ١٠ جم، فيتامين ب١
(ثيامين) ٥ جم، فيتامين ب٢ (بيريدوكسين) ٥ جم، فيتامين ب١٢
(كوبالامين) ٥٠ مجم، فيتامين ج (حمض الأسكوربيك ٩٩٪)
٥٠ جم، فيتامين ك٣ (ميناڨيول ثنائي الصوديوم بيسلفيت) ١ جم،
حمض الفوليك ١ جم، فيتامين ب٣ (النياسين) ٢٠ جم، فيتامين
ب٥ (حمض البانتوثينيك) ٢٠ جم، مركب الأحماض الأمينية ٢٠
جم، مانان-أوليجوساكاريد ١٠ جم، الخرشوف ٢٠ جم،
السوربيتول ٢٠ جم، إل-كارنيتين ٥ جم، حمض الستريك ٥ جم،
كلوريد الكولين ١ جم، مواد تكميلية حتى ١ لتر.

فترة السحب :

لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)