




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Oxy-Dox Mofed



>



>

Poultry

**water soluble powder - Broad spectrum Antibiotic against respiratory
digestive and urogenital tract infections,**

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 gm/ 4 liters of drinking water daily for 5-7 days.

CAUTIONS:

Not to be used in laying hens producing eggs for human consumption.

INDICATIONS:

Oxy-Dox Mofed :broad spectrum antibiotics indicated for prevention & treatment of gastrointestinal, septicaemia, respiratory and urogenital tract infections as : C.R.D (Mycoplasma), colibacillosis, Salmonellosis, coryza, Arthritis and Omphalitis, It is also active against spirochetosis, actinomyces, Rickettsia, Chlamydia and even some protozoa.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Doxycycline Hyclate 400 mg.
Oxytetracycline HCl 400 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Treated birds should not be slaughtered during tretment and within 7 days from the last treatment.



500 gm



(below 30° C)




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

أوكسي-دوكس موفيد



>



>

Poultry

بودة قابلة للذوبان في الماء
مضاد حيوي واسع الطيف لإصابات الجهاز التنفسي و الهضمي و البولي و التناسلي

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ غم لكل ٤ لتر من ماء الشرب يومياً لمدة ٥-٧ أيام.

تحذيرات:

لا يستخدم للدواجن المنتجة لبيض المائدة المعد للاستهلاك البشري

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :

دوكسي سايكلين هايكليت ٤٠٠ ملغم
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلورايد ٤٠٠ ملغم

الخواص العلاجية والإستطبابات:

أوكسي-دوكس موفيد للدواجن: مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للوقاية وعلاج الالتهابات المعدية والمعدية والتسمات الجرثومية الدموية واصابات الجهاز البولي والتناسلي وأمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الرش المزمن (الميكوبلازما) عدوى الاي كولاي، عدوى السالمونيلا، الكوريزا والتهاب المفاصل والتهاب السرة ، وهو فعال أيضاً ضد زهري الطيور ، الفطريات الشعاعية ، والركتسيا والكلاميديا وبعض الأوليات.

فترة السحب :

يجب عدم ذبح الطيور المعالجة خلال فترة العلاج ولمدة ٧ أيام من آخر جرعة علاجية.



٥٠٠ جرام



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)