



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Move Sulfadimidine 100%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Water Soluble Powder

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Via oral route in drinking water.

Calves: 100 mg/kg bodyweight.

Dosage interval: 12-24 hours for 3-5 days.

Poultry (non laying hens and broilers): 100 mg/kg bodyweight (1 g powder/ 1-2 liters drinking water depending on actual water intake).

Acute coccidiosis: administration for 3 consecutive days, after 2 days of no treatment, another 3 days treatment

Subclinical Coccidiosis: administration for 3 consecutive days.

PRECAUTIONS:

Add the required dose to the amount of water that will be consumed in 1 day. Have medicated water available only during treatment period. Treatment should continue 24 to 48 hours even if the symptoms disappeared.

INDICATIONS:

Used for the treatment and control of:

- Septicemia, Pneumonia, various types of Enteritis, Streptococcal mastitis.
- Salmonellosis, Pasteurellosis and Coli infections of Calves and Foals.
- Ceecal coccidiosis and Coryza in Polutry.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Sulphadimidine Sodium 100%

WITHDRAWAL PERIOD:

Poultry Meat: 14 days; Cattle Meat; 21 days
Do not medicate chickens producing eggs for human consumption.
Do not medicate cattle producing milk for human consumption.



500 gm



(below 30°C)



Pharmaceutical

موفي سلفاديميدين ١٠٠٪



Cow



Poultry



Goat



Lamb

بيودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيبة :

كل ١ غرام يحتوي :

سلفاديميدين صوديوم ١٠٠٪

فترة السحب :

لحم الدواجن: ١٤ يوم; الأبقار اللحم: ٢١ يوم
لا يستخدم المنتج في الدواجن المنتجة للبيض
المخصص للاستهلاك البشري.
لا يستخدم المنتج في الأبقار المنتجة للحليب
المخصص للاستهلاك البشري.



۵۰۰ جرام



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)

الجرعات وطريقة الاستعمال :

تعطى عن طريق الفم في ماء الشرب.
 العجول: ١٠٠ ملغم / كغم من وزن الحيوان.
 الفترة بين الجرعتين: ١٢-٢٤ ساعة لمدة ٥-٣ أيام.
 الدواجن (الدجاج الغير بياض والدجاج اللحم): ١٠٠ ملغم / كغم من وزن الجسم (١ غم بودرة ٢-١ لتر من ماء الشرب).
 اعتمادا على كمية المياه المستهلكة.

تحذيرات:

أضف الجرعة المطلوبة لكمية الماء التي يتم استهلاكها في يوم واحد.
يجب تقديم الماء المضاف إليه الدواء خلال فترة العلاج فقط. يجب استمرار تقديم العلاج من ٢٤ - ٤٨ ساعة حتى مع اختفاء أعراض المرض

الخواص العلاجية والاستطبابات:

يستعمل في العلاج والوقاية من:
-التسمم الدموي ، التهاب القصبات الهوائية ، الأنواع المختلفة من التهاب الأمعاء ، التهاب
الصرع الناتج عن البكتيريا العقدية.
-السالمونيلا، الباستريسلوسيز و الالتهابات الناتجة عن الاي كولاي في العجول و
الإبل.