




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

TYLODERN



Cow



Poultry



Goat



Lamb

Pharmaceutical

Water Soluble Powder Broad Spectrum Antimicrobial for Mycoplasmosis

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Chickens and Turkeys: 1 gm per 2 liters of drinking water for 3-5 days.

Calves and Lambs: 10-15 mg/kg of body weight orally.

INDICATIONS:

TYLODERN has a particular action against *Mycoplasma gallisepticum*, which is implicated in causing Chronic Respiratory Disease (CRD) in chickens and infectious sinusitis in turkeys.

TYLODERN has antibacterial spectrum that is essentially active against gram positive bacteria, certain spirochetes, large viruses and certain gram negative bacteria.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Tylosin tartrate 1 gm

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: Poultry: 3 days.

Turkey: 5 days.

Calves: 14 days.

Lambs: 21 days.



500 gm



(below 30°C)




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

Pharmaceutical

تايلوديرن



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودرة قابلة للذوبان في الماء
مضاد للميكروبات واسع الطيف لمرض الميكوبلازما

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدجاج والديك الرومي: ١ جرام لكل ٢ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.
العجول والحملان: ١٠-١٥ ملجم/كجم من وزن الجسم عن طريق الفم.

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يتمتع تايلوديرن بتأثير خاص ضد المايكوبلازما جالسيتيكم ، والذي يتسبب في الإصابة بمرض الجهاز التنفسي المزمن (CRD) في الدجاج والتهاب الجيوب الأنفية المعدي في الديك الرومي.
يتمتع تايلوديرن بطيف مضاد للبكتيريا فعال بشكل أساسي ضد البكتيريا إيجابية الجرام، وبعض أنواع البكتيريا الحلزونية، والفيروسات الكبيرة وبعض أنواع البكتيريا سلبية الجرام.

التركيبة :

يحتوي كل ١ جرام على:
تارتترات تايلوسين ١ جرام

فترة السحب :

اللحوم: الدواجن: ٣ أيام
الديك الرومي: ٥ أيام
العجول: ١٤ يوماً
الحملان: ٢١ يوماً



٥٠٠ جم



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)