



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

MOVE - NEOMYCIN 30%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

WATER SOLUBLE POWDER BROAD SPECTRUM ANTIBIOTIC AGAINST GIT AND SYSTEMIC INFECTIONS

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 g per 2 liters of drinking water daily for 5-7 days.
In feed : 1 kg / ton
Other animals : 1 g per 15 kg of body weight for 3-5 days

INDICATIONS:

It is effective against a wide range of gram-negative and gram-positive bacteria including E.coli, Klebsiella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus, Salmonella, Shigella, Staphylococci and other organisms resistant to other antibiotics such as streptomycin.

It is indicated for the treatment of infectious Enteritis, Diarrhoea Salmonellosis Colibacillosis in poultry, calves, kids & lambs as well as enterotoxemia in lambs.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Neomycin Sulfate 300 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Chicken : 7 days Turkeys : 14 days
Cattle, Sheep and Goats : 14 days



500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

موفي - نيوميسين ٣٠٪



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودة قابلة للذوبان في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف لعدوى الجهاز الهضمي والعدوى الجهازية

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن : ١ جرام لكل ٢ لتر من ماء الشرب يوميًا لمدة ٧-٥ أيام،
في العلف : ١ كجم لكل طن،
الحيوانات الأخرى : ١ جرام لكل ١٥ كجم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.

الخواص العلاجية والإستطابات:

فعال ضد مجموعة واسعة من البكتيريا سالبة وموجبة الجرام، بما في ذلك:
الإشريكية القولونية، الكليبسيلا، الهيموفيلوس، الزائفة، البروتيس، السالمونيلا،
الشيغيلا، والمكورات العنقودية، وغيرها من الكائنات المقاومة للمضادات الحيوية
مثل الستربتوميسين.

يستخدم لعلاج:
التهاب الأمعاء، الإسهال، السالمونيلا، والإصابة بالإشريكية القولونية في الدواجن
والعجول وصغار الماعز والخراف.
التسمم المعوي في الحملان.

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :

سلفات النيوميسين: ٥٠٠ مجم

فترة السحب :

الدجاج ٧ أيام، الديك الرومي ١٤ يومًا
الأبقار والأغنام والماعز ١٤ يومًا



٥٠٠ جرام



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)