



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Pharmaceutical

Ciprodern



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb



Rabbit

Broad spectrum antibiotics

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml/1-2 Lt of drinking water for 3-5 days.
Calves, lambs, kids and rabbits: 1 ml /20 kg b.wt in drinking water for 3-5 days.

INDICATIONS:

Ciprodern contains the antibiotic Ciprofloxacin which is highly effective against Mycoplasma, gram negative bacteria such as; (E.coli, Proteus, Pseudomonas, Salmonella), and gram positive bacteria such as; (Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacteria, Clostridia).

Ciprodern is used for treatment of many infectious diseases in: Poultry:

CRD, Mycoplasma, E.coli, Coryza, Omphalitis, Yolk Sac infection, Salmonellosis and Fowl cholera.

Calves, lambs, kids and rabbits:

Respiratory and urogenital tract infections, diarrhea, enteritis, dysentery, Pasteurellosis and enterotoxaemia.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Ciprofloxacin 100 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Don't use animal products during treatment and within 5 days from the last treatment .



1000 ml



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

سايبيروديرن



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

>



Rabbit

Pharmaceutical

مضاد حيوي واسع الطيف

التركيبة :

يحتوي كل ١ مل على:
سايبيروفلوكساسين ١٠٠ ملغ

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ مل/٢-١ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.
العجول والحملان والصغار والأرانب: ١ مل/٢٠ كجم من وزن الجسم في مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يحتوي سايبيروديرن على المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين الذي يتميز بفعاليتته العالية ضد الميكوبلازما والبكتيريا سالبة الجرام مثل؛ (إي كولاي، بروتئوس، سودوموناس، سالمونيلا)، والبكتيريا موجبة الجرام مثل؛ (ستافيلوكوكس، سترپتوكوكس، كورينيباكتيريا، كلوستريديا).
يستخدم سايبيروديرن لعلاج العديد من الأمراض المعدية في:
الدواجن:

CRD، الميكوبلازما، إي كولاي، كوريزا، التهاب السرة، عدوى كيس الصفار، السالمونيلا وكوليرا الطيور.

العجول والحملان والصغار والأرانب:

التهابات الجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي، الإسهال، التهاب الأمعاء، الزحار، الباستريلا والتسمم المعوي.

فترة السحب :

لا تستخدم المنتجات الحيوانية أثناء العلاج وخلال ٥ أيام من العلاج الأخير.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)