



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

## Moxiteen



HORSE



Pharmaceutical

### Antiparasitic for Oral Use

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Horses above 6.5 months: 5 g pr 100 kg of body weight.

#### INDICATION:

a broad spectrum long acting medicine effective to treatment of mixed cestodes and nematodes or arthropods infections caused by moxidectin and praziquantel sensitive strains of Tapeworms, Large strongyles, Small strongyles, Ascarids in horses.

#### HOW TO USE :

- While holding plunger, turn the knurled ring on the plunger and turn to prescribed quantity.
- Make sure that the horse's mouth is empty and contains no feed.
- Remove the cover from the tip of the syringe.
- Insert the syringe tip into the horse mouth in the space between the teeth.
- Depress the plunger as far as it will go, depositing paste on the back of the tongue.
- Immediately raise the horse head for a few seconds after dosing.

#### COMPOSITION:

Each syringe contains (w/v):  
Moxidectin 585 mg  
Praziquantel 3651 mg  
Excipient up to 30 gm

#### WITHDRAWAL PERIOD:

None



30 gm  $\pm$  %2



( below 30° C )



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

Pharmaceutical

## موكسيتين



HORSE



### معجون موكسيدكتين + برازيكوانتيل مضاد للطفيليات عن طريق الفم

#### الجرعات وطريقة الاستعمال :

الخيول فوق 6 شهور ونصف: ٢,٠٦ غرام من المعجون لكل ١٠٠ كغم من وزن الجسم.

#### الاستخدامات :

هو دواء طويل المفعول واسع النطاق فعال لعلاج الديدان الشريطية المختلطة والديدان الخيطية أو عدوى المفصليات التي تسببها السلالات الحساسة للموكسيدكتين والبرازيكوانتيل من الديدان الشريطية والأسطوانية الكبيرة والأسطوانية الصغيرة والإسكاريديات في الخيول.

#### طريقة الاستخدام :

- أثناء الإمساك بمكبس الحقنة، أدر الحلقة المسننة على المكبس وقم بلفها باتجاه الكمية المحددة .
- تأكد من أن فم الحصان فارغ و لا يحتوي على أي علف.
- قم بإزالة الغطاء عن طرف الحقنة.
- أدخل طرف الحقنة في فم الحصان بين الأسنان.
- اضغط على مكبس الحقنة إلى أقصى حد ممكن، لوضع المعجون على الجزء الخلفي من اللسان.
- ارفع رأس الحصان فوراً ليضع ثوانى بعد إعطاء الجرعة.

#### التركيبة :

كل حقنة تحتوي على (وزن/حجم) :

موكسيدكتين ٠,٥٨٥ غم  
برازيكوانتيل ٣,٦٥١ غم  
مواد حاملة حتى ٣٠ غم

#### فترة السحب :

لا يوجد



30 gm ± 2%



( أقل من 30° درجة مئوية )