



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Flafen

فلافين



HERBICIDE

مبيد عشبي

مبيد عشبي على هيئة مركز قابل للاستحلاب

طريقة الاستعمال :

التركيبية :

اوكسيفلورفين ٢٤٠ غم لكل لتر

الجرعة المضادة:
لا يوجد

مبيد عشبي اختياري يعمل عن طريق
الملامسة لمكافحة الأعشاب الحولية
عريضة الأوراق وبعض الأعشاب
رفيعة الأوراق قبل الإنبات للاستعمال
في محاصيل البصل ، الثوم، الفاكهة،
العنب، الملفوف والزهرة.

فترة تحريم دخول الحقل :

٢٤ ساعة



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)

معدل الاستعمال / يوم	موعد الاستعمال	المحصول
١٠٠ مل	- ري خفيف بعد الزراعة مباشرة - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول	البصل (البذور)
١٥٠ مل	- ري خفيف بعد الزراعة مباشرة - رشه أولى بمعدل ١٥٠ مل / دولم يتبعها ري للمحصول - رشه مرة ثانية بعد شهر من الرشه الأولى بمعدل ١٥٠ مل / دولم	
١٠٠ مل	- تتم الرش في المرة الأولى (في حالة وجود أعشاب عريضة في الحقل) مباشرة بعد الزراعة وري خفيف للمحصول - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول - رشه مرة ثانية بعد شهر من الرشه الأولى بمعدل ١٠٠ مل / دولم	البصل الاصناف المعمرة
١٥٠ مل	- تتم الرش في المرة الأولى (في حالة وجود أعشاب عريضة ورفيعة في الحقل) مباشرة بعد الزراعة وري خفيف للمحصول - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول - رشه مرة ثانية بعد شهر من الرشه الأولى بمعدل ١٥٠ مل / دولم	
٣٠٠ مل	- ري خفيف بعد الزراعة مباشرة - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول - يستعمل المبيد على التربة المحسنة جيداً قبل نقل الشتلات إليها من ٤ - ٧ أيام - ري التربة ري خفيف قبل الزراعة وري المحصول بعد الزراعة	الثوم
٣٠٠ - ٤٠٠ مل	- قبل ظهور الأعشاب تستعمل كعامل وقائي لرش على سطح التربة في آخر فصل الخريف وحتى بداية فصل الشتاء - يستعمل التركيز الأعلى في فصل الربيع - يتم تطبيق الرش على سطح التربة بعد ظهور الأعشاب ويبعد عن الفترة ٣ أسابيع من التزهير و ٣ أسابيع من عقد الثمار	الملفوف، الزهر، البروكلي
٣٠٠ - ٤٠٠ مل	- لا يستخدم المبيد في الانتاج أو التروم التي يقل عمرها عن ٣ سنوات - يتم تطبيق الرش خلال مرحلة السكون	الفاكهات، الزوايت
٣٠٠ - ٤٠٠ مل		المحاصيل
٣٠٠ - ٤٠٠ مل		العنب