



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

BINZEEN 48%

بنزين ٤٨ %



INSECTICIDE

مبيد حشري

مبيد حشري على هيئة مركز معلق

الاستعمال :

الملاحظات	عمر الامان	مدى الاستعمال	الآفة	المحصول
ملاحظة على مزارع سبب الحشرات فور ملاحظتها	الحصاد ٧ ايام الزمن ٢٨ يوم	٧٠ مل / ١٠٠٠ م ^٢ مع باسفايت (٢١,٢) (١٠٠٠ م ^٢ ماء)	حشرات الحبوب ذو الفصين الصمغيات الحشرات الآتية	الحبوب والفاصوليا والذرة والسودق
يجب متابعة المبيدات بحيث يتم تطبيقها ما لا يقل عن ١٠٠٠ لتر من الماء لكل هكتار	الحصاد ١٤ يوم الزمن ٢٨ يوم	٧٠ مل / ١٠٠٠ م ^٢ مع باسفايت (٢١,٢) (١٠٠٠ م ^٢ ماء)	حشرات الحبوب ذو الفصين الصمغيات	الحبوب والفاصوليا والذرة والسودق
التطبيق الكامل لجميع اوراق الشجر امر ضروري فقط في موسم كل موسم	يوم	٧٠ مل / ١٠٠٠ م ^٢ مع باسفايت (٢١,٢) (١٠٠٠ م ^٢ ماء)	حشرات الحبوب ذو الفصين الصمغيات	الحبوب والفاصوليا والذرة والسودق
لا يتم الرش الا في موسم الصيف بين الـ ١٠ و ٢٠ يوم حسب استخدام مبيد حشري	٣ ايام	٧٠ مل / ١٠٠٠ م ^٢ مع باسفايت (٢١,٢) (١٠٠٠ م ^٢ ماء)	حشرات الحبوب ذو الفصين الصمغيات	الحبوب والفاصوليا والذرة والسودق
لا يتم الرش الا في موسم الصيف بين الـ ١٠ و ٢٠ يوم حسب استخدام مبيد حشري	يوم	٧٠ مل / ١٠٠٠ م ^٢ مع باسفايت (٢١,٢) (١٠٠٠ م ^٢ ماء)	حشرات الحبوب ذو الفصين الصمغيات	الحبوب والفاصوليا والذرة والسودق

التركيبية :

بايفنزين ٤٨٠ غم

الجرعة المضادة:
لا يوجد

فترة تحريم دخول الحقل :

يمنع دخول الحقل المرشوش حتى يجف المبيد



٢٥٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)

مبيد حشري انتقائي لمكافحة آفات العث
أكلة النباتات على التفاح والكمثرى
والشمش والبنكريان والذرة واللوب
والخضروات المثمرة بما في ذلك
الطماطم والفلفل والفيلفلة والباذنجان
والقرعيات والفراولة.

عند استخدامه حسب التوجيهات
وتطبيقه على أوراق الشجر، فإنه يقضي
على الحشرات بسرعة لعمله عن طريق
الاتصال المباشر، كما ان له اثرًا متبقياً
جيداً. نظراً لكيميائيته الفريدة وطريقة
عمله وطبيعته الانتقائية فإنه لا يؤثر
ضد العث والحشرات النافعة، وبالتالي
فهو متوافق مع برامج مكافحة
المتكاملة للآفات