



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Alpha Cyperkill



>



Cow



Camel

>



Goat



Lamb

Emulsifiable concentrate - Ectoparasiticide

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Species	Pest	Application rate
Sheeps and Goats	Ticks and lice	1 ml/ 1000 ml water, repeat the treatment after 10 days
	Fleas and scabies	1 ml/ 800 ml water, repeat the treatment after 10 days
Cows ,Horses and Camels	Ticks and lice	1 ml/ 1000 ml water, repeat the treatment after 10 days
	Fleas and scabies	1 ml/ 600 ml water, repeat the treatment after 10 days
Poultry	Mites	1 ml/ 1500 ml water, repeat the treatment after 1 week

Direction for use	Typical pests	Application rate
Surface spray	Mosquitoes, flies and household insect	Dilute 1Liter/200 Liters of water, spray rate: 40 liters solution/1000 m2 repeated after one week

Non-Systemic insecticide with contact and stomach action. acts on the central and peripheral nervous system even when used in very low doses.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Alpha Cypermethrin 10% (w/v)

WITHDRAWAL PERIOD:

meat and milk 7 days



5000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

الفا سايبيركيل



>



Cow



Camel

>



Goat



Lamb

مبيد للطفيليات الخارجية - مركز مستحلب

الاستعمال :

الحيوانات	الآفة	معدل الاستعمال
الأغنام و الماعز	القراد و القمل	١ مل / ١٠٠٠ مل ماء يكرر العلاج بعد ١٠ أيام
	البراغيث و الجرب	١ مل / ٨٠٠ مل ماء يكرر العلاج بعد ١٠ أيام
الابقار و الخيول و الجمال	القراد و القمل	١ مل / ١٠٠٠ مل ماء يكرر العلاج بعد ١٠ أيام
	البراغيث و الجرب	١ مل / ٦٠٠ مل ماء يكرر العلاج بعد ١٠ أيام
الدواجن	الحلم	١ مل / ١٥٠٠ مل ماء يكرر الرش بعد اسبوع

طريقة الاستعمال	الآفة	معدل الاستعمال
الرش السطحي	الناموس، الذباب الحشرات المنزلية واماكن تواجدھا	يخفف كل لتر / ٢٠٠ لتر ماء، ويرش بمعدل ٤٠ لتر من المحلول / ١٠٠٠ م ^٢ . ويكرر بعد اسبوع

التركيبية :

كل ١ مل يحتوي على :
الفا سايبيرمثرين ١٠٪ (و / ح)

فترة السحب :

اللحم و الحليب : ٧ أيام

مبيد حشري غير جهازي يؤثر بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.
يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي للحشرات حتى عند استخدامه بنسب قليلة.



٥٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)