




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

PHOXIM MOVE 50%



(Emulsifiable Concentrate) - Insecticide and Acaricide

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Spray Treatment:

For ticks, lice, flies and maggots (in wounds):

1 ml diluted in 1 liter of water.

Single treatment

In Mange Cases:

1 ml diluted in 1 liter of water.

Two treatments with 7 days interval

In heavy infestation, double the concentration (2 ml per liter water)

Dip Treatment:

For Sheep Mange:

Dilute 1 liter in 1000 liters of water, to prepare dip solution, dilute the required amount of Phoxim Move 50% in 20-10 liters of water, mix properly then add this solution to the dipping tank.

Replenishing the Plunge:

Dip solution:

Replenish after the volume of the dipping tank is reduced by 20%, dilute 200 ml of the product in 100 liters of water.

Treat infection with nasal bots, myiasis, scabies, ticks, lice, kissing bugs and control of cockroaches & farm flies.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

PHOXIM 500 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Cattle meat: 40 days

Sheep and Goat meat: 28 days

Do not use in lactating animals within 2 months before the start of lactation. Do not use during



1000 ml




(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

فوكسيم موفي ٥٠٪



مبيد حشري ومبيد للقراد - مركز قابل للاستحلاب

التركيبية :

كل ١ مل يحتوي على :
فوكسيم ٥٠٠ ملغم

فترة السحب :

لحم الأبقار: ٤٠ يوم
لحم الأغنام والماعز: ٢٨ يوم
لا يستخدم في الحيوانات الحلوب قبل شهرين
من بدء الحليب ولا يستخدم أثناء فترة الحليب

الاستعمال :

الملاسة عن طريق الرش:

في حالات القراد، القمل والذباب (في الجروح)
١ مل يخفف في ١ لتر من الماء. (معاملة واحدة)
في حالات الجرب:

١ مل يخفف في ١ لتر من الماء. (مرتين بينهما فترة ٧ أيام)
في حالات الإصابة الشديدة يتم مضاعفة التركيز (٢ مل لكل لتر)
في حالة التغطيس:

في حالات جرب الأغنام:

يتم تخفيف لتر واحد من المنتج لتحضير محلول التغطيس، يتم تخفيف الكمية المطلوبة من فوكسيم موفي ٥٠٪ في ١٠ - ٢٠ لتر من الماء يخلط جيدا، ثم يضاف هذا المحلول إلى حوض التغطيس.

في حالة التعويض والاستبدال:

عند فقدان ٢٠٪ من حجم حوض التغطيس يتم تعويضه بكمية ٢٠٠ مل من المنتج تذاب في ١٠٠ لتر من الماء.

علاج حالات النفوق، الجرب، حالات الإصابة بالقراد، القمل، البق،
القضاء على الصراصير وذباب المزارع.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)