



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Megalo



>



>

Wax Blocks - Ready to Use

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Rats:

Place an average of 10–60 grams at rat pathways, nesting areas, and around food sources. Maintain a distance of 10 meters between bait placements and leave the bait for 7–10 days without disturbing it. If no rat activity is observed, relocate the bait to areas with more rat activity, reducing the distance between baits to 5 meters in heavily infested areas.

Mice:

Place 5–20 grams in areas infested with mice, maintaining a distance of 2 meters between bait placements. Mice are curious animals and tend to send one of them to sample the bait; if it returns safely, the rest will feed on it. This is an advantage of the rodenticide, as it works slowly. The bait can be replaced every 2–3 days if it is discovered by the mice.

It causes rodents to die painlessly a few days after consuming a single meal, thus preventing bait shyness among the rest of the colony as they all continue feeding.

It eliminates all types of mice and rats.

The shape and color of the bait are attractive to rodents, making it highly palatable and encouraging them to consume a lethal dose more quickly.

It is economical, as the quantity needed to kill rodents is small compared to other products.

It is used to protect crops and orchards, in addition to safeguarding homes and farms from rodent infestations.

COMPOSITION:

Each Kg Contains
Brodifacoum %0.005 w/w

WITHDRAWAL PERIOD:



1000 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

ميغالو



>



>

مكعبات شمعية جاهزة للقوارض فقط - جاهز للاستعمال

الاستعمال :

الجرذان: يوضع ما معدله ١٠ - ٦٠ غم في اماكن مرور وتواجد الجرذان وحول المخابئ واماكن تواجد غذاء الجرذان، يترك مسافة ١٠ م بين الطعم والاخر ويترك الطعم لمدة ٧-١٠ ايام دون ان يحرك. واذا لم يلاحظ اي حركة للجرذان نقوم بتغيير مكان الطعم لمناطق فيها حركة اكثر للجرذان، ونترك مسافة ٥ م بين الطعم والاخر في مناطق تواجد الجرذان بكثرة.

الفئران: يوضع ٥ - ٢٠ غم في المناطق الموبوءة بالفئران ونترك مسافة ٢ م بين الطعم والاخر، تعتبر الفئران من الحيوانات الفضولية والتي تحب الاستكشاف حيث انها ترسل احداها ليتناول من الطعم فان عاد فانها تأكل منه جميعا وهذه ميزة مبيد القوارض حيث يعمل ببطء.

يمكن تغيير الطعم كل ٢ - ٣ ايام في حال تم اكتشاف مكانها من قبل الفئران.

التركيبية :

كل كغم يحتوي على:
بروديفاكوم %٠,٠٠٥ و/و

فترة السحب :

يؤدي الى موت القوارض بدون الم بعد بضعة ايام من تناولها وجبة منه وبالتالي لا يحدث نفور من قبل باقي القطيع حيث ان الجميع يتناول منه.

يقضي على جميع انواع الفئران والجرذان.

ان شكل ولون المبيد مغري للقوارض بحيث تستسيغ طعمه ولهذا فأنها تأكل جرعة قاتلة منه بسرعة أكبر.

اقتصادي حيث ان الكمية اللازمة لقتل القوارض قليلة بالمقارنة مع المواد الاخرى.

يستخدم لحماية المزروعات والبساتين اضافة الى حماية المنازل والمزارع من افات القوارض.



١٠٠٠ جم



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)