



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Oxalic farm



>



>

Bee

Natural, effective, safe and strong Helps eliminate Varroa

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

One bee space (seam) needs 5 ml of Oxalic farm (30-50 ml per hive)
Use only once.

How to use:

Trickling:

A needle is used to adjust the dose

5 ml of Oxalic farm are administered to each bee space (seam) occupied by bees.

Do not use during honey flow

Special warnings:

This product has corrosive properties. Personal protective equipment should be worn.

Do not use at temperatures below 8°C.

INDICATIONS:

It is used to combat the Varroa destructor in honey bee colonies with and without brood.

Since Varroa destructor causes:

- Decreased flight efficiency in infected males
- Loss of protein level and loss of blood volume in insects, This causes the bee sect to collapse
- Decrease bee average life.
- Transmission of viral and bacterial diseases

COMPOSITION:

Each one ml contains:

Pure Crystals of oxalic acid %3.5

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

أوكساليك فارم



Bee

Pharmaceutical

طبيعي، فعال، آمن وقوي يساعد في القضاء على الفاروا

الجرعات وطريقة الاستعمال :

يحتاج الشارع النحلي (أي بين كل إطارين) الواحد ٥ مل من أوكساليك فارم
يتم الاستخدام لمرة واحدة فقط.

طريقة الاستخدام:

التنقيط:

يتم استخدام إبرة لتعديل الجرعة

يتم إعطاء ٥ مل من أوكساليك فارم لكل شارع نحلي (أي بين كل إطارين) يحتوي على النحل.
لا يستخدم أثناء تدفق العسل

تحذيرات خاصة:

يحتوي هذا المستحضر على خصائص تأكل، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية.

لا يستعمل هذا المستحضر في درجات حرارة أقل من ٨ درجات مئوية

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يستعمل لمكافحة الفاروا المدمرة لنحل العسل في المستعمرات الخالية من الحضنة والتي تحتوي على الحضنة.

حيث أن الفاروا المدمرة تسبب:

- انخفاض كفاءة الطيران في الذكور المصابة
- انخفاض مستوى البروتين وفقد في حجم الدم في الحشرات وهذا يسبب انهيار طائفة النحل
- انخفاض متوسط أعمار النحل
- انتقال الأمراض الفيروسية والبكتيرية

التركيبية :

كل واحد مل يحتوي:

بلورات نقية من حمض الأوكساليك
بنسبة ٣.٥٪

فترة السحب :

لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)