



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Ampicillin-Move 50 %



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Water Soluble Powder

Broad – Spectrum Antibiotic Against GIT and Systematic Infections

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 gm/3 liters of drinking water for 5 days.

Calves & Lambs: 1-4 gm/animal twice a day for 5 days.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use for ruminating calves and lambs.

INDICATIONS:

Ampicillin belongs to Penicillin group which is used for treatment of bacterial infections.

Possessing the typical activity of penicillin against gram positive and gram negative bacteria.

Ampicillin- Move 50 % is indicated for the treatment of infections caused by E.coli, Clostridium, Salmonella, Brucella, Proteus, Klebsiella, Strepto and Staphylococci, Corynebacterium, Haemophilus, Pasteurella, and Shigella in different animals.

Ampicillin- Move 50 % is recommended for use in cases of Bacterial enteritis and Necrotic enteritis in poultry.

It is also indicated against pneumonia, septicemia, diarrhea, and scours in calves and lambs.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Ampicillin Trihydrate 500 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

5 days



500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

أمبيسيلين-موفي ٥٠ %



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودرة ذوابة في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف لعدوى الجهاز الهضمي والعدوى الجهازية

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ غم / ٣ لتر من مياه الشرب لمدة ٥ أيام .
العجول والحملان: ٤-١ غم / حيوان مرتين باليوم لمدة ٥ أيام.
موانع الاستخدام :
عدم استخدامه للعجول و الحملان المجتررة (غير الرضعية)

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي على:

أمبيسيلين تراي هيدريت ٥٠٠ ملغم

الخواص العلاجية والإستطابات:

الأمبيسيلين من مجموعة البنسلين الذي يستعمل لعلاج الامراض الناتجة عن الاصابة بالبكتيريا موجبة وسالبة الغرام
أمبيسيلين-موفي ٥٠ % يعطى لعلاج الالتهابات التي تسببها الاي كولاي، كلوستريديوم، السالمونيلا، البروسيلا، بروتيس، كليبسيلا، سترپتوكوكس وستافيلوكوكس، كورانيكتيريوم، هيروفيلس، باستوريلا و شيجيلا في الحيوانات المختلفة.
أمبيسيلين-موفي ٥٠ % يفضل اعطاؤه في حالات التهاب الأمعاء البكتيرية والتهاب الأمعاء التكرزي في الدواجن. ويعطى أيضا ضد الالتهاب الرئوي، تسهم الدم، والإسهال والتهاب الأمعاء في العجول والحملان.

فترة السحب :

٥ أيام.



٥٠٠ جرام



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)