



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Pharmaceutical

Ampicillin Move Plus



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Water Soluble Powder - For GIT and Systemic Infections

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 gm per 2 liters of drinking water for 3-5 days
Calves, lambs and other animals: 1-2 gm per 10 kgs of body weight via drinking water for 3-5 days, the dose can be doubled in severe cases.

INDICATIONS:

Ampicillin Move Plus is indicated for the treatment of infections caused by E.coli, Clostridium, Salmonella, Brucella, Proteus, Klebsiella, Streptococci, Staphylococci, Corynebacterium, Haemophilus, Pasteurella, and Shigella in different animals. Ampicillin Move Plus is used in cases of Bacterial enteritis and Necrotic enteritis in poultry. It is also indicated for Pneumonia, Septicemia, Diarrhea and Enteritis in calves and lambs

COMPOSITION:

Each 1 gram contains:
Ampicillin Trihydrate 200 mg
Colistin Sulfate 800.000 I.U

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: 7 days

Eggs: 3 days



500 gm



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

Pharmaceutical

أمبيسيلين موفي بلس



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودة قابلة للذوبان في الماء - لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ جرام لكل ٢ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام
العجول والحملان والحيوانات الأخرى: ١-٢ جرام لكل ١٠ كجم من وزن الجسم
عن طريق مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام، ويمكن مضاعفة الجرعة في الحالات
الشديدة.

الخواص العلاجية والإستطابات:

يستخدم أمبيسيلين موفي بلس لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا القولونية،
والكلوستريديوم، والسالمونيلا، والبروسيلا، والبروتيس، والكلبسيلا، والعقديات،
والمكورات العنقودية، والكورينباكتيريوم، والهايموفيلوس، والباستوريلا، والشيجيلا في
الحيوانات المختلفة.

يستخدم أمبيسيلين موفي بلس في حالات التهاب الأمعاء البكتيري و التهاب الأمعاء النخرية
في الدواجن.

كما يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي، وتسمم الدم، والإسهال والتهاب الأمعاء في العجول
والحملان

التركيبية :

يحتوي كل جرام على:
أمبيسيلين ثلاثي الهيدرات ٢٠٠ مجم
كوليستين سلفات ٨٠٠,٠٠٠ وحدة دولية

فترة السحب :

للحوم: ٧ أيام
للبيض: ٣ أيام



٥٠٠ جم



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)