



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

MODEXINE 2%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Oral Solution Through Drinking Water

INDICATIONS:

"Modexine 2%" is indicated as an expectorant during treatment of respiratory tract diseases associated with retention of mucoid secretions such as bronchitis. It is also used as aid therapy in the treatment of bronchopneumonia in horses, cattle, dogs and cats , as well as, for treatment of amniotic fluid aspiration in newborn animals.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml per 2 liters of drinking water for 3-5 days.
Cattle: 1 ml per 10 kg of body weight for 5-7 days.
Horses: 1 - 2.5 ml per 50 kg of body weight for 5-7 days.
Pets : 0.5-1 ml per 5 kg of body weight for 5-7 days.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

Bromhexine Hydrochloride
20 mg.

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

مودكسين ٢٪



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

محلول فموي يضاف الى ماء الشرب

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يستعمل مودكسين ٢٪ كمشقق طارد ومذيب للبلغم خلال علاج حالات أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة باحتباس الإفرازات المخاطية مثل التهاب الشعب الهوائية كما يساعد في علاج التهابات الشعبات الرئوية في الخيول والأبقار والكلاب والقطط وكذلك في علاج استنشاق السائل الأمنيوسي في الحيوانات حديثة الولادة.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن : ١ مل لكل ٢ لتر من ماء الشرب لمدة ٣-٥ أيام.
الأبقار : ١ مل لكل ١٠ كغم من وزن الحيوان لمدة ٥-٧ أيام.
الخيول : ١-٢,٥ مل لكل ٥٠ كغم من وزن الحيوان لمدة ٥-٧ أيام.
الحيوانات الأليفة : ٠,٥ - ١ مل لكل ٥ كغم من وزن الحيوان لمدة ٥-٧ أيام.

التركيبة :

كل ١ مل يحتوي :

برومكسين هيدروكلورايد ٢٠ ملغم.

فترة السحب :

لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)