



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## Modetryl Plus



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

### Oral Solution - Broad Spectrum Antibiotic

#### INDICATIONS:

Enrofloxacin has a broad range of lethal effect on most types gram-negative bacteria, which include E-coli and salmonella, Klebsiella, hemophilus, pasteurilla and pseudomonas and gram-positive bacteria: Clostridia, Staphylococcus, Streptococcus, Chlamydia and Mycoplasma that affects the pulmonary system, Digestive system, and reproductive system.

Modetryl Plus contains bromhexien, which enhances its effect and removes congestion in the upper respiratory tract and dissolves and expels mucous secretions.

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry:

1 ml per 2-4 litres of drinking water for 3-5 days.

Calves, goats and sheep:

0,5 ml per 20-40 kg of body weight for 3-5 days.

#### COMPOSITION:

Each 1 ml contains  
Enrofloxacin 200 mg  
Bromhexien Hydrochloride 10 mg

#### WITHDRAWAL PERIOD:

For meat: 7 days.



1000 ml




( below 30°C )



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## موديتريل بلص



محلول فموي - مضاد حيوي واسع الطيف

### الخواص العلاجية والإستطابات:

إن إنروفلوكساسين يتمتع بمجال واسع من التأثير القاتل على معظم أنواع البكتيريا سالبة الجرام، والتي تشمل الإشريكية القولونية، السالمونيلا، الكليبيسيلا، الهيموفيلوس، الباستوريلا، والزائفة. كما يؤثر على البكتيريا موجبة الجرام، مثل الكلوستريديا، المكورات العنقودية، العقدية، الكلاميديا، والميكوبلازما التي تصيب الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز التناسلي. يحتوي موديتريل بلص على برومهيكسين، الذي يعزز تأثيره، ويساعد في إزالة الاحتقان في الجهاز التنفسي العلوي، كما يعمل على إذابة وإخراج الإفرازات المخاطية.

### الجرعات وطريقة الاستعمال:

الدواجن:  
١ مل لكل ٢-٤ لترات من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.  
العجول، الماعز، والأغنام:  
٥,٠ مل لكل ٢٠-٤٠ كجم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.

### التركيبة:

يحتوي كل ١ مل على:

إنروفلوكساسين ٢٠٠ مجم  
برومهيكسين هيدروكلوريد ١٠ مجم

### فترة السحب:

فترة السحب للحوم: ٧ أيام.



١٠٠٠ مل



( أقل من ٣٠ درجة مئوية )