



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## MOVE - NEOMYCIN 50%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

### WATER SOLUBLE POWDER BROAD SPECTRUM ANTIBIOTIC AGAINST GIT AND SYSTEMIC INFECTIONS

#### INDICATIONS:

It is effective against a wide range of gram-negative and gram-positive bacteria including E.coli, Klebsiella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus, Salmonella, Shigella, Staphylococci and other organisms resistant to other antibiotics such as streptomycin.

It is indicated for the treatment of infectious Enteritis, Diarrhoea Salmonellosis Colibacillosis in poultry, calves, kids & lambs as well as enterotoxemia in lambs.

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 0.5 gm per 2-4 liters of drinking water daily for 3-4 days.  
Other animals: 1 gm / 25 kg b.w divided in 2 dose for 4-5 days.

#### COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Neomycin Sulfate 500 mg

#### WITHDRAWAL PERIOD:

Chicken: 7 days.

Cattle, Sheep and Goats: 3 days.



500 gm



( below 30°C )



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## موفي - نيومايسين ٥٠٪



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف لعدوى الجهاز الهضمي والعدوى الجهازية

### الخواص العلاجية والإستطبابات:

فعال ضد مجموعة واسعة من البكتيريا سالبة وموجبة الجرام، بما في ذلك: الإشرىكية القولونية، الكليبيلا، الكليبيلا، الهيموفيلوس، الزائفة، البروتيتوس، السالمونيلا، الشبغلا، والمكورات العنقودية، وغيرها من الكائنات المقاومة للمضادات الحيوية مثل الستربتومايسين.

يستخدم لعلاج:

التهاب الأمعاء، الإسهال، السالمونيلا، والإصابة بالإشرىكية القولونية في الدواجن والعجول وصغار الماعز والخراف والحملان و الجديان كذلك .  
التسمم المعوي في الحملان.

### الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ٠,٥ جرام لكل ٢-٤ لتر من مياه الشرب يوميًا لمدة ٣-٤ أيام.  
الحيوانات الأخرى: ١ جرام لكل ٢٥ كجم من وزن الجسم، مقسمة على جرعتين يوميًا لمدة ٤-٥ أيام.

### التركيبة :

كل ١ غرام يحتوي :

سلفات النيومايسين: ٥٠٠ مجم

### فترة السحب :

الدجاج: ٧ أيام.

الأبقار، الأغنام، الماعز: ٣ أيام.



٥٠٠ جرام



( أقل من ٣٠ درجة مئوية )