



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

MODITRYL 10 %



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

Oral Solution - Broad Spectrum Antibiotic

INDICATIONS:

Enrofloxacin has an extensive effect against wide range of infectious diseases that affect the respiratory system, digestive system and urogenital system. Its activity covers all Gram-positive and Gram-negative bacteria including: E.coli, Salmonella, Staphylococci, Haemophilus, Pasteurella, Streptococcus .. etc, It is also effective against many diseases caused by Mycoplasma and Chlamydia.

Moditryl 10% is indicated mainly for the treatment of salmonellosis, colibacillosis and CRD infections in poultry

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml per 2 liters of drinking water for 3-5 days.
Calves, goats and sheep: 1 ml per 15-20 kg of body weight for 3-5 days

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Enrofloxacin 100 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

meat: 12 days.



1000 ml



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

مودتريل ١٠٪



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

محلول فموي - مضاد حيوي واسع الطيف

الخواص العلاجية والإستطابات:

إن إنزوفلوكساسين له تأثير واسع النطاق ضد مجموعة واسعة من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي. يغطي نشاطه جميع البكتيريا إيجابية الجرام وسلبية الجرام بما في ذلك: الإشريكية القولونية والسالمونيلا والمكورات العنقودية والمستدمية والباستوريلا والعقدية .. إلخ، كما أنه فعال ضد العديد من الأمراض التي تسببها الميكوبلازما والكلاميديا.

يُستطَب موديتريل ١٠٪ بشكل أساسي لعلاج داء السالمونيلا وداء العصيات القولونية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي في الدواجن

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ مل لكل ٢ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.
العجول والماعز والأغنام: ١ مل لكل ٢٠-١٥ كجم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.

التركيبية :

يحتوي كل ١ مل على:
إنزوفلوكساسين ١٠٠ ملغ

فترة السحب :

للحوم: ١٢ يومًا.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)