



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

LINCODERN



Cow



Goat



Lamb

Intramammary solution

INDICATIONS:

LINCODERN is a broad spectrum antibiotic with action against gram positive and gram negative bacteria, for example (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus pyogenes), and gram negative for example (Escherichia coli, Klebsiella spp, Shigella spp, Pseudomonas spp, Salmonella spp, Mycoplasma spp.) LINCODERN helps to alleviate the signs of edema, heat and pain in addition to allowing a better diffusion of the antibiotics through inflamed tissues, decreasing the recovery time.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administered by Intramammary infusion only.

LINCODERN is given intramammary after a good milking of the affected quarter, applying the content of 10 ml syringe, with a light massage upwards. The treatment can be repeated on every 12 hours, for 3 to 4 days according to the evolution of the condition.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

Lincomycin (as Lincomycin-HCl)	20.0 mg
Neomycin (as Neomycin sulphate)	20.0 mg
Dexamethasone	0.10 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Milk: 4 days from the last treatment.



10 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

لينكودرين



>



Cow

>



Goat



Lamb

محلول الضرع

الخصائص العلاجية والإستطبابات:

لينكودرين هو مضاد حيوي واسع الطيف ذو فعالية ضد البكتيريا موجبة الجرام وسلالة الجرام، مثل المكورات العنقودية، والعقديات، والإشريكية القولونية، والكلبسيلا، والشيغيليا، والزانفة، والسامونيلا، والماليكوبلازمـا.

يساعد لينكودرين في تخفيف أعراض الوذمة، والحرارة، والألم، بالإضافة إلى تحسين انتشار المضادات الحيوية عبر الأنسجة الملتئبة، مما يقلل من وقت التعافي.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

يعطى عن طريق الحقن داخل الضرع فقط.

يتم إعطاء لينكودرين داخل الضرع بعد حلب جيد للربع المصاب، وذلك بتطبيق محتوى الحقنة ذات ١٠ مل مع تدليك خفيف للأعلى.

يمكن تكرار العلاج كل ١٢ ساعة لمدة ٣ إلى ٤ أيام وفقاً لتطور الحالة.

التركيبة :

كل ١ مل يحتوي :

لينكومايسين (كمادة لينكومايسين-هيدروكلورايد) ٢٠٠،٠ مل
نيومايسين (كمادة نيومايسين سلفات) ٢٠٠،٠ مل
ديكساميثازون ٠،١٠ مل

فترة السحب :

الحليب: ٤ أيام منذ آخر علاج.

١٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)