



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

FIVESTIN



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Anti Gastro-Intestinal Tract Infection

INDICATIONS:

Fivestin is indicated for the treatment of G.I.T infections caused by E.Coli, Salmonella and other bacteria susceptible to colistin in calves, sheep, goats and poultry.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Calves, sheep and goats: 1 gm per 80 kg of body weight twice daily for 5 - 7 days.
Poultry: 10 - 20 g per per 100 liters of water continuously for 5 - 7 days.
The water or milk must be used immediately for treatment and re-prepared every 24 hours throughout the treatment period.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:
Colistin (as Sulphate) 4,800,000 IU

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat & offal: 1 day.
Eggs: 0 days



1000 gm



(below 30° C)

Pharmaceutical



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

فايف ستين



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

بودرة نوابة في الماء - لعدوى الجهاز الهضمي

التركيبة :

كل ١ جرام يحتوي :
كوليستين (على هيئة سلفات)
٤,٨٠٠,٠٠٠ وحدة دولية.

فترة السحب :

اللحوم والأحشاء: ١ يوم
بيض: لا يوجد

الخواص العلاجية والإستطابات:

يستخدم فايف ستين لعلاج أمراض الجهاز الهضمي التي تسببها الايكولاي، السالمونيلا، الشيغيلا، الكليسيلا وغيرها من البكتيريا الحساسة للكوليستين في العجول، الأغنام، الماعز والدواجن.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

العجول والحملان : ١ غ لكل ٨٠ كغم من وزن الجسم مرتين يوميا لمدة ٥ - ٧ أيام.
الدواجن والديك الرومي: ١٠ - ٢٠ غرام لكل ١٠٠ لتر من ماء الشرب بشكل مستمر لمدة ٥ - ٧ أيام..
يجب استخدام الماء أو الحليب للعلاج فوراً وإعادة تحضيره كل ٢٤ ساعة طوال مدة العلاج.



١٠٠٠ جرام



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)