



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Pharmaceutical

Tetradern 10%



>



Cow



Camel



Goat



Lamb

>



Horse



Poultry

Water soluble powder

INDICATIONS:

- Tetradern 10% is broad spectrum and powerful anthelmintic (imidothiazole group) against nematodes (round worms) of the gastrointestinal tract and the lung worms of ruminant.
- Tetradern 10% at the therapeutic dose. is safe even for the pregnant animals
- Tetradern 10% exert its anthelmintics action by paralyzing the nematode. The paralysis is due to sustained muscle contraction which leads to neuro – muscular paralysis of the parasites.
- For the treatment and control of parasitic gastro – enteritis and verminous bronchitis caused by round worms (Nematodes):
- Ruminants:
Gastro – intestinal worms: Ascaris, Nematodirus, Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, Strongyloides.
- Lung worms: Dictyocaulus.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Sheep, goats, cattle, camels: 1.5 gm per 10 kg body weight in drinking water or mixed with feed.
Repeat for prevention every 4-6 months.
Poultry, Pigeons: 0.18 mg per kg body weight.
Repeat every 3 months.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:
Tetramisole HCL 100 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

For meat and eggs consumption:
7 days.
For milk consumption: 1 day..



1000 g



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

تيتراديرين ١٠٪



Cow



Camel



Goat



Lamb



Horse



Poultry

Pharmaceutical

بودرة ذوابة في الماء

التركيبية :

كل ١ غم يحتوي على:
تيترا اميزول هيدروكلورايد ١٠٠ ملغم

فترة السحب :

لاستهلاك اللحوم و البيض: ٧ أيام.
لاستهلاك الحليب: ١ يوم.

الخواص العلاجية والإستطابات:

•تيتراديرين ١٠٪ هو مضاد للديدان واسع الطيف وقوي (مجموعة إيميدوثيازول) ضد الديدان الأسطوانية (الديدان المدورة) في الجهاز الهضمي وديدان الرئة لدى الحيوانات المجترة.
•تيتراديرين ١٠٪ ضمن الجرعة العلاجية، آمن حتى للحيوانات الحوامل.
•يمارس التيتراديرين ١٠٪ تأثيره المضاد للديدان عن طريق شل حركة الديدان الخطية.
يحدث الشلل بسبب تقلص العضلات المستمر مما يؤدي إلى شلل عصبي عضلي للطفيليات.
لعلاج والسيطرة على التهاب المعدة والأمعاء الطفيلي والتهاب الشعب الهوائية الناجم عن الديدان المدورة (الديدان الأسطوانية):
•الحيوانات المجترة:
الديدان المعديّة-المعوية: الإسكاريس، النيما توديروس، هيمنوشوس، أوسترتاجيا، كوبريا، ثريسوريس , سترنجيلويدس .
ديدان الرئة:ديكتوكالوس
•الدواجن: أسكاريديا، هينيراكيس، كابيلاريا، أميدوسوم.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الأغنام والماعز والأبقار والجمال: ١,٥ غم لكل ١٠ كغ من وزن الجسم في ماء الشرب أو خليط الأعلاف.
كرر للوقاية كل ٤ - ٦ أشهر
الدواجن والحمام: ١٥ - ٢٠ ملغم لكل ١ كغ من وزن الجسم.
كرر كل ٣ أشهر.



١٠٠٠ جرام



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)