



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Metro-Dern



>



Rabbit



Birds

>



Cat



Dog

for treatment of gastrointestinal tract infections - Oral suspension

INDICATIONS:

This product is indicated in the treatment of diarrhea caused by giardia, coccidia, whipworms, roundworms or hookworms and Bacterial infections, including salmonella. Also, it is used in treatment of trichomoniasis and anaerobic infections.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

For oral administration:

Dogs and cats: 25 mg/kg body weight once or twice daily for 7-5 days.

Rabbits: 25 mg/kg body weight once or twice daily for 5-3 days.

Birds: 2-1 ml mixed with 1 L of drinking water for 10 days.

Precaution

1. This product has little toxicity, and its metabolites often make urine reddish brown. When the dose is too large, it is easy to have light tongue, gastritis, nausea, vomiting, leucopenia and even neurological symptoms, but pets are well tolerated.

2. It can pass through placental barrier and breast barrier, not suitable for lactation and early pregnant animals.

COMPOSITION:

Each ml contains
Metronidazole 125 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



100 ml



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

ميتر- ديرن



>



Rabbit



Birds

>



Cat



Dog

لعلاج التهابات الجهاز الهضمي - معلق فموي

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يستخدم هذا المنتج في علاج الإسهال الناتج عن الجiardia، الكوكسيديا، الديدان السوطية، الديدان الأسطوانية أو الديدان الخطافية والالتهابات البكتيرية، بما في ذلك السالمونيلا. كما يستخدم في علاج داء المشعرات والالتهابات اللاهوائية.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

عن طريق الفم:

الكلاب والقطط: ٢٥ مجم/كجم من وزن الجسم مرة أو مرتين يوميًا لمدة ٧-٥ أيام.

الآرانب: ٢٥ مجم/كجم من وزن الجسم مرة أو مرتين يوميًا لمدة ٣-٥ أيام.

الطيور: ٢-١ مل مخلوطًا مع لتر واحد من مياه الشرب لمدة ١٠ أيام.

الاحتياطات

١. هذا المنتج قليل السمية، وغالبًا ما تجعل نواتج أيضه البول بنيًا محمرًا. عند زيادة الجرعة، من السهل حدوث ألم خفيف في اللسان، والتهاب المعدة، والغثيان، والتقيؤ، وقلة الكريات البيض، وحتى الأعراض العصبية، ولكن الحيوانات الأليفة تتحمل ذلك جيدًا.
٢. يمكن أن يمر عبر حاجز المشيمة وحاجز الثدي، وهو غير مناسب للحيوانات المرضعة والحامل في بداية الحمل.

التركيبة :

يحتوي كل مل على
ميترونيدازول ١٢٥مجم

فترة السحب :

لا يوجد



١٠٠ مل



(أقل من 30° درجة مئوية)