



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

# PROGSTREEN



Cat



Dog

## Oral Hormone Tablets for Dogs and Cats

### INDICATIONS:

PROGSTREEN tablets for dogs and cats contains the megestrol acetate which is used for Oestrus control and treatment of the miliary dermatitis and eosinophilic granuloma (rodent ulcer) in the cats. And postponement or prevention of oestrus and the treatment of false pregnancy and oestrogen dependent mammary tumours in the bitches.

PROGSTREEN tablets used for the prevention of unwanted pregnancy in the female dogs and cats. PROGSTREEN tablets recommended to administration by the oral route in the male dogs treatment of hyper sexuality which may be manifest as undesirable behavior in male dogs.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Dogs (Female):

- Postponement of oestrus: (0.5 mg per kg) daily for a maximum period of 40 days as shown in the dosage table. The course of tablets should commence preferably 14 days at least before the oestrus. A series of postponement courses may be given provided the bitch is not medicated more than twice during 12 month period.

Weight (kg)	Dose (Tablet 5 mg)
6 - 10	1
16 - 20	2
21 - 30	3
31 - 40	4
41 - 50	5

- Prevention of oestrus (suppression of heat):

For normal dosage regimen: give 2 mg per kg daily for 8 days as shown in the dosage table. The course of tablets should commence at the onset of pro-oestrus by the presence of both haemorrhage and vulval swelling. The stage of the oestrus cycle may be confirmed by the examination of vaginal smears.

Weight (kg)	Dose (Tablet 5 mg)
2.5 - 5	2
6 - 7.5	3
8 - 10	4
11-15	6

For extended dosage regimen: give 2 mg per kg daily for 4 days followed by 0.5 mg per kg daily for 16 days as shown in the dosage table. The use of this prolonged prevention course is advised in first season bitches, and may also be beneficial in bitches with a history of false pregnancy, in some cases where other abnormalities of the oestrus cycle are known to occur and when the animal to be medicated is housed with other bitches.

Weight (Kg)	Dose (Tablet 5 mg)
For 4 days	
2.5 - 5	2
6 - 7.5	3
8 - 10	4
11- 15	6
For 16 days	
6 - 10	1
16- 20	2
21 - 30	3
31 - 40	4
41 - 50	5

Dogs male:

For undesirable behavior in dogs: Recommended to administration by the oral route given whole or crushed and mixed with food.

- Initial dosing: 2 mg per kg daily for 7 days.

- Subsequent dosing:

Improved: 1 mg per kg daily for 14 days

Not improved: 4 mg per kg daily for 7 days

Cats Female:

- Oestrus control:

Postponement of oestrus: 1 tablet per cat once weekly for up to 15 weeks. Dosage should commence in anoestrus (the non-breeding season).

Prevention of oestrus: 1 tablet per cat daily for three days, given when the Signs of Desire to mating appear.

- Treatment of miliary eczema (miliary dermatitis) and eosinophilic granuloma (rodent ulcer) in cats: The recommended dosage is 1 tablet per cat every two to three days until the lesions begin to regress then once weekly until a satisfactory response is obtained. In some cases it may be necessary to give a maintenance dosage of 2.5 mg per cat weekly or fortnightly to prevent recurrence of the condition.

### COMPOSITION:

Each tablet contains:  
Megestrol Acetate 5 mg

### WITHDRAWAL PERIOD:

None



120 tablets



( below 30°C )



## شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

## بروجسترين

Pharmaceutical



>



Cat



Dog

>

أقراص هرمونية فموية للكلاب والقطط

### الخواص العلاجية والإستطبابات:

تحتوي أقراص بروجسترين للكلاب والقطط على ميجيسترون أسيتات والتي تستخدم للتحكم في الشبق وعلاج التهاب الجلد الدخني والحبيبات الحمضية (قرحة القوارض) في القطط. وتأجيل أو منع الشبق وتآجيل أو منع الحمل الكاذب وأورام الثدي المعتمدة على هرمون الاستروجين في الكلاب.

تستخدم أقراص بروجسترين للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه في الكلاب والقطط الإناث. يوصى بإعطاء أقراص بروجسترين عن طريق الفم للكلاب الذكور لعلاج فرط النشاط الجنسي الذي قد يتجلى في سلوك غير مرغوب فيه في الكلاب الذكور.

### التركيبية :

كل حبة تحتوي على :  
ميجيسترون أسيتات ٥ ملغ

### الجرعات وطريقة الاستعمال :

الكلاب (الإناث):

- تأجيل الشبق: (٥ - ١٠) ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة أقصاها ٤٠ يوما كما هو موضح في جدول الجرعات. يجب أن تبدأ دورة الأقراص قبل ١٤ يوما على الأقل من الشبق. يمكن إعطاء سلسلة من دورات التأجيل بشرط ألا يتم إعطاء الكلاب (الإناث) الدواء أكثر من مرتين خلال فترة ١٢ شهرا.

الوزن (كغ)	الجرعة (قرص ٥ ملغم)
١ - ٦	١
٦ - ١٦	٢
١٦ - ٢١	٣
٢١ - ٣١	٤
٣١ - ٤١	٥

- منع الشبق (قمع الحرارة):

نظام الجرعات الطبيعي: أعط ٢ ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة ٨ أيام كما هو موضح في جدول الجرعات. يجب أن تبدأ دورة الأقراص عند بداية الشبق من خلال وجود زفير وتورم الفرج. يمكن تأجيل مرحلة دورة الشبق من خلال فحص سمات المهيأ.

الوزن (كغ)	الجرعة (قرص ٥ ملغم)
٥ - ٢,٥	٢
٢,٥ - ٧,٥	٣
٧,٥ - ١٠	٤
١٠ - ١١	٦



١٢٠ قرص



( أقل من ٣٠ درجة مئوية )

الوزن (كغ)	الجرعة (قرص ٥ ملغم)
٤ - ١٦	٢
١٦ - ٢١	٣
٢١ - ٣١	٤
٣١ - ٤١	٥
٤١ - ٤٦	٦

نظام الجرعات المعتدل: أعط ٢ ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة ١٦ لمدة ٤ أيام بها ٥. ٥ ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة ١٦ يوما كما هو موضح في جدول الجرعات. ينصح باستخدام دورة الوقاية الممتدة هذه في الموسم الأول لاشي الكلاب ، وقد تكون مفيدة أيضا في الشبق الكلاب التي لديها تاريخ من العمل الكلاب، في بعض الحالات حيث من المعروف حدوث تشوهات أخرى في دورة الشبق، وعندما يتم إيواء الجوان التي سيتم إعطاؤه الدواء مع الكلاب الأخرى.

الكلاب (الذكور):

للتحكم غير المرغوب فيه في الكلاب: يوصى بإعطاء عن طريق الفم كاملاً أو مسحوقاً ومزجاً بالطعام.

- الجرعة الأولى: ٢ ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة ٧ أيام

- الجرعة الثانية:

١ ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة ١٤ يوما

عدم التحسن: ٤ ملغم لكل كيلوغرام يومياً لمدة ٧ أيام

القطط (الإناث):

- التأجيل في الشبق:

تأجيل الشبق: قرص واحد لكل فترة يومياً لمدة ثلاثة أيام، ثم بعد ظهور علامات الرغبة في التزاوج.

- علاج الأكزيما الدخنية (التهاب الجلد الدخني) والحبيبات الحمضية (قرحة القوارض) في القطط: الجرعة اليومية بها هي قرص واحد لكل فترة كل يومين (إلى ثلاثة أيام حتى تبدأ الآثار في التراجع ثم مرة واحدة أسبوعياً حتى يتم التخلص من المسائل على امتدادية مرضية. في بعض الحالات قد يكون من الضروري إعطاء جرعة وقائية تبلغ ٢,٥ ملغم لكل فترة أسبوعياً أو كل أسبوعين لمنع تكرار الحالة.