




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Doxy Dern 100



>



Cat



Dog

>

Anti-Biotic Tablet

INDICATIONS:

Doxymoved 100 is in the tetracycline class of antibiotics and works by blocking the bacteria's protein synthesis that they need to live. Without these proteins, the bacteria's cell wall becomes altered and its ability to properly replicate and grow is compromised.

- Some Conditions Doxymoved 100 is Prescribed to Treat in Dogs and Cats:

- spirochetes (spiral-shaped bacteria)
- feline infectious anemia (Mycoplasma hemofelis)
- leptospira
- canine ehrlichiosis (anaplasmosis)
- kennel cough (bordetella bronchiseptica)
- toxoplasma (from a single-celled parasite)
- tick-borne diseases (Lyme Disease, Rocky Mountain Spotted Fever)
- chlamydia
- canine parvovirus
- salmon poisoning (neorickettsia helminthoeca)

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Should be administered after food.

E.Canis infection 5 mg of Doxycycline Hyclate per kg of body weight every 12 hours (10 mg/kg of body weight every 24 hours), for 2-3 weeks.

Other susceptible infections 5-10 mg of Doxycycline Hyclate per kg of body weight for up to 5 days.

COMPOSITION:

Each tablet contains:
Doxycycline Hyclate 100 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



10 tablet



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

دوكسي ديرن ١٠٠



>



Cat



Dog

>

مضاد حيوي

الخواص العلاجية والإستطبابات:

دوكسي ديرن ١٠٠ ينتمي إلى فئة المضادات الحيوية التتراسيكلين ويعمل عن طريق منع تخليق البروتين في البكتيريا الذي تحتاجه للعيش. بدون هذه البروتينات، يتغير جدار الخلية للبكتيريا وتضعف قدرتها على التكاثر والنمو بشكل صحيح.

- بعض الحالات التي يوصف دواء دوكسي ديرن ١٠٠ لعلاجها في الكلاب والقطط:
- البكتيريا الحلزونية الشكل
- فقر الدم المعدي لدى القطط
- البكتيريا الحلزونية
- داء الإبرليخية لدى الكلاب
- سعال الكلاب
- داء المقوسات (من طفيلي وحيد الخلية)
- الأمراض التي ينقلها القراد (داء لايم، حمى جبال روكي المرقطة)
- الكلاميديا
- الفيروس البارفو لدى الكلاب
- التسمم بالسلمون

الجرعات وطريقة الاستعمال :

يجب إعطاؤه بعد الطعام.
عنوى E. Canis : ٥ ملغ من دوكسيكلين لكل كيلو غرام من وزن الجسم كل ١٢ ساعة (١٠ ملغ/كغ من وزن الجسم كل ٢٤ ساعة)، لمدة ٢-٣ أسابيع.
العنوى الأخرى الحساسة: ٥-١٠ ملغ من دوكسيكلين لكل كيلو غرام من وزن الجسم لمدة تصل إلى ٥ أيام.

التركيبية :

كل حبة تحتوي على :
دوكسيكلين هيكليت ١٠٠ ملغم

فترة السحب :

لا يوجد



١٠ اقراص



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)