



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Feed Additives

Actifarm Plus



Poultry



Food supplement - anti-stress

Growth accelerator and immune booster - Inhibitor for the growth of bacteria and harmful fungal

INDICATIONS:

- Accelerates the growth processes of young and resists harmful bacterial and fungal diseases (diarrhea).
- Used in laying hens, mother hens and broilers to avoid low feed conversion (low egg production - egg size Quality of hatching eggs - bird weight...etc.) especially when changing feed.
- It is used before and during marketing to increase the weight of poultry and reduce diarrhea and mortality rate.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

1 ml per 1 liter of drinking water for 5-7 days.

COMPOSITION:

Each 1 liter contains:
Methionine and amino acids 350 grams
(Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cysteine
Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine,
Leucine, Lysine Hcl, Phenylalanine, Proline, Serine,
Taurine, Threonine, Tyrosine).
Formic Acid, Propionic Acid, Lactic Acid, Acetic
Acid 540 grams

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

أكتيفارم بلص



Poultry



Feed Additives

مكمل غذائي- مضاد للإجهاد
مسرع للنمو ورافع للمناعة - مثبط لنمو البكتيريا والفطريات الضارة

الخواص العلاجية والإستطابات:

- يسرع في عمليات النمو للصغار ومقاومة الأمراض البكتيرية والفطريات الضارة (الإسهالات).
- يستخدم في الدجاج البياض وأمهات الدجاج والدجاج اللحم لتجنب إنخفاض التحويل الغذائي (إنخفاض إنتاج البيض- حجم البيضة , جودة بيض التفريخ - وزن الطائر...الخ) خاصة عند تغيير العلف.
- يستخدم قبل وخلال التسويق لزيادة على وزن الدواجن وخفض الإسهالات ونسبة الوفيات.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

١ مل لكل ١ لتر من ماء الشرب لمدة ٥-٧ أيام.

التركيبية :

كل ١ يحتوي على لتر :
ميثونين وأحماض أمينية ٣٥٠ جرام
(الأتين، أرجينين، حمض الأسبارتيك، الميسيتين ، حمض الجلوتاميك، الجاليسين، الهستيدين، إيزولوسين، الليوسين، ليسين هيدروكلورايد ، فينيل ألتين، بروتين، السيرين، التورين، ثريونين، التيروزين).
حمض فورميك أسيد وحمض بروبيونك أسيد وحمض اللاكتيك وحمض الأستيك ٥٤٠ جرام

فترة السحب :

لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)