



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Feed Additives

Leva Barakeh Dern



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Oral Solution - stimulates, stimulates and activates the immune system
It is given after vaccines, especially EP, gumboro, Newcastle, etc.

INDICATIONS:

Activates and stimulates the immune system against bacterial, parasitic, and viral diseases such as Newcastle and Gumboro, etc.
Maximizes the effectiveness of vaccines.
Increases fertility rates in roosters and hens and improves growth rates.
Reduces the need to use of drugs and antibiotics.
Compensates for vitamin deficiencies.
Used to treat all stages of roundworms and lungworms.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml per 1 liter of drinking water for 3-5 days.
Large animals: 2 ml per 6.5 kg of body weight, dissolved in water and administered orally for one day, then repeated after 21 days.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Black Seed oil
Thyme oil
Vitamin A 4,000 IU
Vitamin E 15 IU
Vitamin D3 2,000 IU
Vitamin C 15 mg
L Carnitine 15 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

ليفافركة ديرن



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Feed Additives

محلول فموي يحفز وينشط الجهاز المناعي.
يُعطى بعد اللقاحات، خاصة ضد الإشريكية القولونية (EP)، الجامبورو، والنيوكاسل، وغيرها.

الخواص العلاجية والإستطبابات:

ينشط ويحفز الجهاز المناعي ضد الأمراض البكتيرية والطفيلية والفيروسية مثل النيوكاسل والجامبورو، وغيرها.
يعزز فعالية اللقاحات.
يزيد من معدلات الخصوبة في الديوك والدجاج ويحسن معدلات النمو.
يقلل من الحاجة الى استخدام الأدوية والمضادات الحيوية.
يعوض نقص الفيتامينات.

التركيبة :

يحتوي كل ١ مل على:
زيت الحبة السوداء، زيت الزعتر،
فيتامين أ بتركيز ٤,٠٠٠ وحدة دولية،
فيتامين هـ بتركيز ١٥ وحدة دولية،
فيتامين د٣ بتركيز ٢,٠٠٠ وحدة دولية،
فيتامين ج بتركيز ١٥ مجم،
إل-كارنيتين بتركيز ١٥ مجم.

فترة السحب :

لا يوجد

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ مل لكل ١ لتر من ماء الشرب لمدة ٣-٥ أيام.
الحيوانات الكبيرة: ٢ مل لكل ٦,٥ كجم من وزن الجسم، يذاب في الماء ويُعطى عن طريق الفم ليوم واحد، ثم يُكرر بعد ٢١ يوماً.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)