



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

MOVESTIN FORT



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Oral Solution - Strong and Effective Against Gastro-Intestinal Tract Infection

INDICATIONS:

MOVESTIN FORT contains colistin, which is highly effective against gram-negative bacteria, especially E. coli. MOVESTIN FORT is used for the treatment of diarrhea and gastrointestinal tract infections in poultry, calves, lambs, and kids caused by gram-negative bacteria such as: E. coli, Klebsiella, Pasteurella, Shigella, Pseudomonas, Salmonella. MOVESTIN FORT has an effective and strong topical effect on the digestive system after oral administration.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Oral administration via drinking water:
Calves and lambs: 1 ml per 6 kg, twice a day for 3 days with drinking water.
Poultry: 1 ml per 6 L of drinking water for 3 days, twice a day.
Medicated drinking water/milk replacer should be used within 24 hours.

COMPOSITION:

Each 1 ml Contains:
Colistin Sulfate: 3,000,000 IU

WITHDRAWAL PERIOD:

Calves, Lambs meat & Offals: 7 days
Layers, Broiler meat & Offals: 1 day
Other Poultry: 7 days
Eggs: Zero withdrawal period



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي ستين فورت



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

سائل فموي - قوي وفعال ضد عدوى الجهاز الهضمي

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يحتوي موفي ستين فورت على الكوليستين، وهو فعال للغاية ضد البكتيريا السالبة الجرام، خاصة الإشريكية القولونية
يستخدم موفي ستين فورت لعلاج الإسهال والالتهابات المعوية في الدواجن والعجول والحملان وصغار الماعز، والتي تسببها البكتيريا السالبة الجرام مثل:
الإشريكية القولونية، الكلبسيلا، الباستوريلا، الشيغيلا، الزانفة، والسالمونيلا
كما أن موفي ستين فورت له تأثير موضعي قوي وفعال على الجهاز الهضمي بعد الإعطاء عن طريق الفم.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

يُعطى عن طريق الفم عبر مياه الشرب:
العجول والحملان: ١ مل لكل ٦ كجم، مرتين يوميًا لمدة ٣ أيام مع مياه الشرب.
الدواجن: ١ مل لكل ٦ لترات من مياه الشرب لمدة ٣ أيام، مرتين يوميًا.
يجب استخدام الماء أو بديل الحليب المعالج خلال ٢٤ ساعة.

التركيبية :

يحتوي كل ١ مل على:

كوليستين سلفات: ٣,٠٠٠,٠٠٠ وحدة دولية

فترة السحب :

لحم العجول، الحملان والأحشاء: ٧ أيام
لحم وأحشاء الدجاج اللحم: يوم واحد
الطيور الأخرى: ٧ أيام
البيض: لا توجد فترة سحب (يمكن استخدامه دون قيود).



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)