



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## OXY MOVE 10%



>



Bee



Poultry

>



Goat



Lamb

### Powder - Broad spectrum antibiotic Against GIT and systemic infections

#### INDICATIONS:

It is a water-soluble antibiotic for poultry and other animals. It is administered through drinking water or through feed. The active material in is Oxytetracycline which is a broad-spectrum antibiotic that is effective against susceptible gram-positive and gram-negative bacteria such as Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplasma and Chlamydia. is recommended for treating Mycoplasmosis, Spirochetosis, Actinomycetes, Fowl Cholera, Typhoid, Coryza, Infectious sinusitis and synovitis.

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Calves : 100 mg per Kg of bodyweight for 24 hours after symptoms disappear.

Poultry: 2.5 g. per 1 liters of drinking water for 5-10 days.

Bees: 1 g is dissolved in a liter of water and 100 ml is taken

Mix with 500 ml of sugar solution for 4 - 5 days

**Note :** Prepare fresh solutions every 24 hours

#### COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Oxytetracycline HCL 100 mg

#### WITHDRAWAL PERIOD:

Meat : 14 days

Egg : 4 days



500 gm



( below 30°C )



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## اوكسي-موفي ١٠٪



>



Bee



Poultry

>



Goat



Lamb

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف للنزلات المعوية والإصابات العامة

### الخواص العلاجية والإستطابات:

إنه مضاد حيوي قابل للذوبان في الماء للدواجن والحيوانات الأخرى. يتم إعطاؤه من خلال مياه الشرب أو من خلال العلف. المادة الفعالة فيه هي أوكسي تنزاسيكلين وهو مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد البكتيريا إيجابية الجرام وسلبية الجرام الحساسة مثل العقديّة والمكورات العنقودية والميكوبلازما والكلاميديا. يوصى به لعلاج داء الميكوبلازما وكلاميديا وينصح به للعلاج من الكوليرا , التيفوئيد , الكورايزا , الزكام والتهاب الجيوب الانفية .

### الجرعات وطريقة الاستعمال :

الحملان : ١٠٠ ملغم لكل كغم من وزن الحيوان لمدة ٢٤ ساعة بعد أختفاء أعراض المرض

الدواجن : ٢,٥ غم لكل ١ لتر من ماء الشرب لمدة ٥-١٠ أيام.

النحل : يتم إذابة ١ غم في لتر ماء ثم يتم أخذ ١٠٠ مل ويخلط مع ٥٠٠ مل محلول سكر لمدة ٤ - ٥ أيام

**ملاحظة :** يجب تحضير محلول جديد كل ٢٤ ساعة

### التركيبة :

كل ١ غرام يحتوي :

أوكسيتينتراسايكلين هايدروكلورايد ١٠٠ ملغم

### فترة السحب :

الحوم : ١٤ أيام

البيض : ٤ أيام



٥٠٠ جرام



( أقل من ٣٠ درجة مئوية )