



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

## OXY MOVE 50%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

### INDICATIONS:

It is a water-soluble antibiotic for poultry and other animals. It is administered through drinking water or through feed. The active material in is Oxytetracycline which is a broad-spectrum antibiotic that is effective against susceptible gram-positive and gram-negative bacteria such as Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplasma and Chlamydia. is recommended for treating Mycoplasmosis, Spirochetosis, Actinomycetes, Fowl Cholera, Typhoid, Coryza, Infectious sinusitis and synovitis.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 50 gm/200 liter of drinking water for 3-5 days or 0.5 Kg Per ton of feed for 3-5 days.  
Lambs, Kids, Calves: 0.5 gm Per 20 kg body weight daily and orally with water for 3-5 days.

### COMPOSITION:

Each 1 gm contains:  
Oxytetracycline (HCl) 500 mg

### WITHDRAWAL PERIOD:

Meat : 14 Days  
Eggs : 4 Days



500 gm




( below 30° C )



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

## أوكسي موفي ٥٠ %



Pharmaceutical

### الخواص العلاجية والإستطابات:

إنه مضاد حيوي قابل للذوبان في الماء للدواجن والحيوانات الأخرى. يتم إعطاؤه من خلال مياه الشرب أو من خلال العلف. المادة الفعالة فيه هي أوكسي تتراسيكلين وهو مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد البكتيريا إيجابية الجرام وسلبية الجرام الحساسة مثل العقديية والمكورات العنقودية والميكوبلازما والكلاميديا. يوصى به لعلاج داء الميكوبلازما وكلاميديا وينصح به للعلاج من الكوليرا , التيفويد , الكورازا , الزكام والتهاب الجيوب الانفية .

### الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ٥٠ جرام لكل ٢٠٠ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام أو ٠,٥ كجم لكل طن من العلف لمدة ٥-٣ أيام.  
الحمالان، الصغار، العجول: ٠,٥ جرام لكل ٢٠ كجم من وزن الجسم يوميًا عن طريق الفم مع الماء لمدة ٣-٥ أيام.

### التركيبية :

يحتوي كل ١ جرام على:  
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ٥٠٠ مجم

### فترة السحب :

للحوم : ١٤ يوم  
للبيض : ٤ أيام



٥٠٠ جم



( أقل من ٣٠ درجة مئوية )