



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Insecticide

Mimati

ميماتي



INSECTICIDE

مبيد حشري

مبيد حشري على هيئة مركز معلق

التركيبية :

إيميداكلوبرايد ٣٥٠ غم لكل لتر

مبيد حشري جهازى يؤثر بشكل فعال عن طريق الجذور كما يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي، يمتص مباشرة من النبات وينتقل جهازيا بشكل جيد.

طريقة الاستعمال :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة الأمان
التفاح	المن العنقي	٣,٥ مل/ ١ لتر ماء لكل شجرة (سفلية)	١٤ يوم
الفلفل، البانجان، البندورة	الذبابة البيضاء	١٤ مل/ ١٠٠ متر بالأتلام (يخلط المبيد مع ٣ لتر ماء) (الري بالتنقيط)	٧ أيام
البطاطا	الذبابة البيضاء	١٤ مل/ ١٠٠ متر بالأتلام (يخلط المبيد مع ٣-١,٥ لتر ماء) (الري بالتنقيط)	١٤ يوم
	المن	٩ مل/ ١٠٠ متر بالأتلام (يخلط المبيد مع ٣-١,٥ لتر ماء) (الري بالتنقيط)	
الحمضيات من الحمضيات الأسود، صناعات الأفلاق، الحشرات القشرية	من الحمضيات الأسود، صناعات الأفلاق، الحشرات القشرية	٣,٥ مل/ ١ لتر ماء لكل شجرة (الري بالرشاشات او التنقيط)	١٤ يوم

الجرعة المضادة:

لايوجد

فترة تحريم دخول الحقل :

٤٨ ساعة



١٠٠٠ مل/ ٢٥٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)