شركة الحديثــة لصناعة الأدوية البيطريــة و المبيــدات الزراعيــة

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Insecticide

Move-Oxamyl 24 موف -اوكساميل ٢٤

INSECTICIDE

مبيد حشري

مبيد حشري على هيئة مركز قابل للذوبان في الماء

التركيبة :

كل ١ لتر يحتوي على:
اوكساميل ٢٤غم

الجرعة المضادة:

أتروبين وتتم المعالجة حسب الأعراض.

فترة تحريم دخول الحقل :

٢٤ ساعة

١٠٠٠ مل

(أقل من ٣٠ درجة مئوية)

مبيد حشري جهازي يعمل بالملامسة ويمتص عن طريق الاوراق والجذور في النبات.

طريقة الاستعمال :

جدول الاستعمال :

المحصول	الآفة	نسبة الإستعمال	فترة الأمان	موعد الإستعمال	ملاحظات
التفاح	من التفاح	الرش الورقي 95 - 189 مل / 20 لتر ماء	14 يوم	يتم الرش قبل الإزهار /قبل تفتح البتلات الرش عند ظهور الإصابة	.لا يسمح بالرش خلال فترة الازهار او خلال 30 يوم بعد الإزهار .لا يسمح باستخدام المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم وينصح باستخدام مبيدات اخرى من مجموعة مختلفة بالتناوب مع المبيد .لا يسمح برعي الحيوانات بالمناطق المعاملة .يعاد الرش بعد 7 أيام على الأقل من آخر معاملة
	صانعات الأنفاق	الرش الورقي 95 - 189 مل / 20 لتر ماء		للحصول على أفضل النتائج يتم الرش قبل أن تبدأ اليرقات بالتغذي على الأوراق ويعاد الرش بعد 7 - 14 يوم من الرشة الأولى	
	الحلم الأحمر الأوروبي / الحلم ذو النقطتين	الرش الورقي 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		يتم الرش عند ملاحظة وجود 2 - 4 حلم /ورقة ويعاد الرش بعد 7 - 14 يوم من الرشة الأولى	
	نطاط الأوراق	الرش الورقي 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		الرش عند ظهور الإصابة ويعاد الرش بعد 10 - 14 يوم بعد الرشة الأولى	
	بقة السونة	الرش الورقي 75 - 200 مل / 20 - 160 لتر ماء		الرش عند ملاحظة وجود الآفة ويعاد الرش بعد ٧ أيام من الرشة الأولى وللحصول على أفضل نتائج خلال عملية الرش يتم تغطية جميع أجزاء النبات بشكل كامل بالمبيد	
ليمون برتقال بوملي جريب فروت كلمنتينا و كمكوات	حلم الحمضيات الصدئي	الرش الورقي 6 - 25 مل / 20 لتر ماء	7 أيام	يتم الرش عند ظهور الإصابة ويعاد الرش بعد 4 - 6 أسابيع من الرشة الأولى عندما تكون الإصابة متوسطة أو بعد 2 - 3 أسابيع من الرشة الأولى عندما تكون الإصابة شديدة	.لا يسمح باستخدام المبيد أكثر من 6 مرات خلال الموسم . لا يسمح برعي الحيوانات بالمناطق المعاملة ولا يسمح بالرش خلال فترة وجود النحل .يتم إضافة المبيد في أنظمة الري بالتنقيط أو نظام ال microspinkler وذلك في اخر دورة من نظام الري . يعاد الرش بعد 14 يوم على الأقل من اخر معاملة.
	التربس	الرش الورقي 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		يتم الرش في أوائل الربيع قبل الإزهار عندما يكون النمو الجديد " ٣ إلى 4 ورقات". وفي وقت سقوط البتلات (لمنع حدوث ندب على الفاكهة) وخلال منتصف الصيف (لحماية النموات الجديدة)	
	نيماتودا الحمضيات	في نظام الري بالتنقيط 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		في الربيع يتم معالجة التربة عندما تكون درجات حرارة التربة 10 درجات منوية على عمق 30 سم ويستمر العلاج حتى تصبح درجة حرارة التربة أقل من 10 درجات منوية. أفضل الفصول لمعاملة التربة هي: ابريل ،مايو، ويونيو والاستمرار خلال شهر أغسطس سبتمبر واكتوبر لإعطاء نتائج جيدة.	
كرز خوخ اجاص	الحلم ، المن النطاطات	الرش الورقي 50 - 100 مل / 20 لتر ماء	14 يوم	يتم الرش عند ظهور الآفة	. لا يسمح برش المبيد أكثر من 5 رشات خلال الموسم أو 6 معاملات خلال الموسم متضمنة معاملات التربة. . يعاد الرش بعد 14 يوم على الأقل من اخر معاملة. . يمنع الرش في حالة تعرض النبات للإجهاد - ينصح باستعمال مبيدات اخرى من مجموعة مختلفة بالتناوب مع المبيد
	النيماتودا	الرش الورقي 50 - 100 مل /20 لتر ماء معاملة التربة قبل الزراعة (1 لتر / 20 لتر ماء)		يسمح بالرش 4 مرات على أن تكون الفترة بين الرشات 2 - 3 اسابيع يتم معاملة التربة على عمق 10 - 15 سم وقبل 24 ساعة من نقل الشتلات	
	بقة السونة	الرش الورقي 75 - 200 مل / 20 - 160 لتر ماء			

المحصول	الآفة	نسبة الإستعمال	فترة الأمان	موعد الإستعمال	ملاحظات
الخيار الشمام البطيخ الكوسا واليقطين	نيماتودا تعقد الجذور	معاملة التربة قبل الزراعة 94 - 189 مل / 20 لتر ماء	3 أيام	---------------	. في حال انتشار النيماتودا بشكل كبير بالتربة ينصح باستعمال مبيدات اخرى من مجموعة مختلفة بالتناوب مع المبيد .حقن التربة يكون على عمق 5 سم. .لا يسمح برش المبيد أكثر من 2 رشة خلال الموسم أو 3 معاملات خلال الموسم
		الرش الورقي 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		الرشة الأولى بعد الزراعة ب 2 - 4 أسابيع والرشة الثانية بعد الرشة الأولى ب 2 - 3 أسابيع.	
		في أنظمة الري بالتنقيط وحقن التربة 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		تعامل التربة خلال عملية نقل الأشتال أو خلال 16 يوم من عملية نقل الأشتال وعند اللزوم يتم المعاملة مرة ثانية وثالثة وبين كل معاملة 10 - 14يوم.	
	صانعات الأنفاق المن والتربس	الرش الورقي 47 - 95مل / 20 لتر ماء		الرشة الأولى بعد الزراعة ب 2 - 4 أسابيع وعند اللزوم يتم الرش مرة ثانية بعد 7 أيام من الرشة الأولى.	
		في أنظمة الري بالتنقيط والحقن (لصانعات الأنفاق) 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		تعامل التربة خلال عملية نقل الأشتال أو خلال 16 يوم من عملية نقل الأشتال وعند اللزوم يتم المعاملة مرة ثانية وثالثة وبين كل معاملة 10 - 14 يوم.	
الباذنجان	المن.صانعات الأنفاق والحلم	الرش الورقي 47 - 95 مل / 20 لتر ماء	3 أيام	يتم الرش عند ظهور الآفة وإعادة الرش تكون بين 10 - 21 يوم	يعاد الرش بعد 10 أيام على الأقل من اخر معاملة. لا يسمح برش المبيد أكثر من 4 رشات خلال الموسم أو 6 معاملات خلال الموسم .في حال انتشار النيماتودا بشكل كبير بالتربة ينصح باستعمال مبيدات اخرى من مجموعة مختلفة بالتناوب مع هذا المبيد
	النيماتودا	معاملة التربة 95 مل / 20 لتر ماء	7 أيام	تتم معاملة التربة على عمق 5 سم بعد 2 - 3 أسابيع من نقل الأشتال وتعامل التربة مرة اخرى بعد 2 - 4 أسابيع من المعاملة الأولى.	
		الرش الورقي 95 مل / 20 لتر ماء		يتم الرش مرتان الرشة الأولى خلال 10 - 14 يوم والرشة الثانية بعد 2 - 4 أسابيع من الرشة الأولى.	
		في أنظمة الري بالتنقيط وحقن التربة 47 - 95 مل / 20 لتر ماء		يتم حقن التربة بالمبيد على عمق 5 سم.	
الثوم	تربس البصل تربس الأزهار	الرش والسقاية بأنظمة الري المختلفة 47 - 95 مل / 20 لتر ماء	14 يوم	يتم الرش عند وجود 1 - 3 تربس على النبات	يعاد الرش بعد 7 أيام على الأقل من اخر معاملة. لا يسمح باستخدام المبيد أكثر من 8 مرات خلال الموسم
الفلفل	نيماتودا تعقد الجذور	معاملة الأشتال 25 مل/ 20 لتر ماء	7 أيام	معاملة الأشتال خلال عملية نقل الأشتال	-يعاد الرش بعد 7 أيام على الأقل من آخر معاملة
		رش الأشتال 47 مل / 20 لتر ماء		-----------------------------------	
الجزر	نيماتودا تعقد الجذور	معاملة التربة قبل وبعد الزراعة (1 لتر / 20 لتر ماء)	14 يوم	تعامل الجذور قبل اسبوع من الزراعة أو قبل انبثاق النبات في حال تمت المعاملة بعد الزراعة على عمق 5 سم.	.لا يسمح بإضافة المبيد على التربة مباشرة أكثر من 3 مرات خلال الموسم أو لا يسمح باستخدام المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم. يعاد الرش بعد 14 يوم على الأقل من آخر معاملة
		في أنظمة الري 0 - 19 مل / 20 لتر ماء		قبل انبثاق النبات	
		أتلام (1 لتر / 20 لتر ماء)		تعامل التربة مباشرة خلال عملية الزراعة في الاتلام	
	خنافس الجزر	رش التربة 250 - 500 مل / 20 لتر		تتم الاضافة الى التربة على عمق 5 سم	