



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Insecticide

THIAMAN

ثيامان



INSECTICIDE

مبيد حشري

مبيد سام - حبيبات قابلة للإنتشار بالماء

التركيبية :

ثياميثوكسام ٢٥٪ و/و

الاستعمال :

توصيات الإستعمال سقاية عن طريق التربة :

المحصول	الآفة	معدل الإستعمال غرام/ ٢٠ لتر	عدد الرشات	الفترة بين الرشة و الأخرى/يوم	فترة الامان/يوم
البطاطا	نخاط الأوراق، المن	٤٠-٢٣	٣	٧	١٤
الذنبور، الخبار ، المن، نخاط الأوراق، المن	٤٠-٣	٣	٣	٥	٣
الذنبور، الخبار ، المن، نخاط الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	٥	٣
المن	٤٠-٤	٣	٣	٧	٧
من الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	١٠	١٤
من الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	٧	١٤
من الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	٧	١٤
من الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	٧	١٤
من الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	٧	١٤
من الأوراق، المن	٤٠-٤	٣	٣	٧	١٤

توصيات الإستعمال رشاً على المجموع الخضري :

المحصول	الآفة	معدل الإستعمال غرام/هكتار	ملاحظات
البطاطا	المن، الذنبور، الخبار ، نخاط الأوراق	٨٠-٤٠	تم المعاملة عند نيل الأشغال و ذلك بسقي النباتات من خلف شبكة الري حيث يغلف في وحدة السميد و يوزع بشكل متساو في الحقل
المن	٤٠٠	٤٠٠	تم المعاملة عند نيل الأشغال و ذلك بسقي النباتات من خلف شبكة الري حيث يغلف في وحدة السميد و يوزع بشكل متساو في الحقل
البطاطا	المن، الجاسيد	٤٠٠	تم المعاملة على الأنظمة و خطوط الزراعة عند أو قبل الزراعة
المن	٤-٢ غرام للشجرة	٤-٢ غرام للشجرة	تم المعاملة في بداية الربيع
المن	٨-٦ غرام للشجرة	٨-٦ غرام للشجرة	تم المعاملة في بداية الربيع

الجرعة المضادة:

لا يوجد

فترة تحريم دخول الحقل :

١٢ ساعة



١٠٠٠ جم



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)