



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Move SDK Fort



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb



Rabbit

Water Soluble Powder - Anti-coccidiosis

INDICATIONS:

is used for treatment of coccidiosis in poultry caused by *Eimeria tenella*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maximxa* and *Eimeria necatrix*. Treatment acute fowl cholera and pallorum disease and treatment of coccidiosis in rabbits.

Treatment pasteurellosis, bacteria pneumonia, colibacillosis and coccidiosis in small ruminants.

Is used for treatment of colisepticaemia. Pneumonia, enteritis and infections caused by salmonella, pasteurela and colifrum.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry and rabbits: 1 gm/2 Lt of drinking water for 3 days, rest for 2 days and then continue the treatment for another 2 days.
Small animals: 2 gm/5 kg of body weight for 24 hours.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Sulfadimidine Sodium	330 mg
Diaverdine HCL	50 mg
Vitamin K3	20 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Animal products should not be consumed during treatment and before 10 days after the last dose.



500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي إس دي ك فورت



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb



Rabbit

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد كوكسيديا

الخواص العلاجية والإستطابات:

يستخدم لعلاج الكوكسيديا في الدواجن التي تسببها إيميريا تينيللا ، إيميريا أكبر فولينا ، إيميريا ماكسيمكسا وإيميريا نيكاتريكس .علاج مرض كوليرا الطيور الحاد والشحوب وعلاج الكوكسيديا في الأرانب. علاج البسترة ، والالتهاب الرئوي البكتيري ، داء القولون وداء الكوكسيديا في الحيوانات المجترة الصغيرة.
يستخدم لعلاج كوليسيتيسيميا، الالتهاب الرئوي والتهاب الأمعاء والالتهابات التي تسببها السالمونيلا، والباستوريلا والقولونيات.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن والأرانب: ١ غم / ٢ لتر ماء الشرب لمدة ٣ أيام، والراحة لمدة يومين ثم مواصلة العلاج لمدة يومين آخرين.
الحيوانات الصغيرة: ٢ غم/ ٥ كغم من وزن الجسم لمدة ٢٤ ساعة.

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :

سلفاديميدين الصوديوم ٣٣٠ ملغرام
دايفردين هيدروكلورايد ٥٠ ملغرام
فيتامين ك ٣ ٢٠ ملغرام

فترة السحب :

لا ينبغي استهلاك المنتجات الحيوانية أثناء العلاج وقبل ١٠ أيام من آخر جرعة.



٥٠٠ جرام



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)