



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Move Sulfadimidine 100%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Water Soluble Powder

INDICATIONS:

Used for the treatment and control of:

- Septicemia, Pneumonia, various types of Enteritis, Streptococcal mastitis.
- Salmonellosis, Pasteurellosis and Coli infections of Calves and Foals.
- Cecal coccidiosis and Coryza in Polutry.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Via oral route in drinking water.

Calves: 100 mg/kg bodyweight.

Dosage interval: 12-24 hours for 3-5 days.

Poultry (non laying hens and broilers): 100 mg/kg bodyweight (1 g powder/ 1-2 liters drinking water depending on actual water intake).

Acute coccidiosis: administration for 3 consecutive days, after 2 days of no treatment, another 3 days treatment

Subclinical Coccidiosis: administration for 3 consecutive days.

PRECAUTIONS:

Add the required dose to the amount of water that will be consumed in 1 day.

Have medicated water available only during treatment period. Treatment should continue 24 to 48 hours even if the symptoms disappeared.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Sulphadimidine Sodium 100%

WITHDRAWAL PERIOD:

Poultry Meat: 14 days; Cattle Meat; 21 days

Do not medicate chickens producing eggs for human consumption.

Do not medicate cattle producing milk for human consumption.



5000 / 1000 / 500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

موفي سلفاديميدين ١٠٠٪



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودرة قابلة للذوبان في الماء

الخواص العلاجية والإستطابات:

- يستعمل في العلاج والوقاية من:
- تسمم الدم ، التهاب القصبات الهوائية ، الأنواع المختلفة من التهاب الأمعاء ، التهاب
- الضرع الناتج عن البكتيريا العقدية .
- داء السالمونيلا ، الباستوريلا و الالتهابات الناتجة عن الاي كولاي في العجول و الأمهر.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

تعطى عن طريق الفم في ماء الشرب.
العجول: ١٠٠ ملغم / كغم من وزن الحيوان.
الفترة بين الجرعتين: ١٢-٢٤ ساعة لمدة ٣-٥ أيام.
الدواجن (الدجاج الغير بياض والدجاج اللحم): ١٠٠ ملغم / كغم من وزن الجسم (١ غم بودرة / ١-٢ لتر من ماء الشرب).
اعتمادا على كمية المياه المستهلكة.
الكوكسيديا الحادة: يعطى لمدة ٣ ايام متتالية بعد يومين من توقف العلاج ثم يعطى العلاج لمدة ٣ ايام.
الاصابة تحت السريرية الكوكسيديا: يعطى العلاج لمدة ٣ ايام متتالية

تحذيرات:

أضف الجرعة المطلوبة لكمية الماء التي يتم استهلاكها في يوم واحد.
يجب تقديم الماء المضاف إليه الدواء خلال فترة العلاج فقط. يجب استمرار تقديم العلاج من ٢٤ - ٤٨ ساعة حتى مع اختفاء أعراض المرض

التركيبه :

كل ١ غرام يحتوي :

سلفاديميدين صوديوم ١٠٠٪

فترة السحب :

لحم الدواجن: ١٤ يوم; الأبقار اللحم: ٢١ يوم
لا يستخدم المنتج في الدواجن المنتجة للبيض
المخصص للاستهلاك البشري.
لا يستخدم المنتج في الأبقار المنتجة للحليب
المخصص للاستهلاك البشري.



٥٠٠ / ١٠٠٠ / ٥٠٠٠ جرام



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)