



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Otitis Move -Drops



>



Cat



Dog

>

Antiparasitic, Antibacterial, Antifungal and Anti-inflammatory

INDICATIONS

For the treatment of mixed otitis externa of bacterial, fungal and parasitic origin respectively due to bacterial strains sensitive to neomycin, fungi sensitive to nystatin and ear mites sensitive to permethrin

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

The external ear canals should be cleaned before treatment.
The ear cannula must be vertically positioned to ensure accurate dosing.
In adult cats and dogs:
Insert 3/5 dropper ($\approx$ 0.3 ml) into each ear.
In kittens:
Insert 1/5 dropper ($\approx$ 0.1 ml) into each ear.
Gently massage the base of the ears to uniformly disperse the medicine.
Treat once a day for 10 consecutive days.
Both ears should be treated even if only one seems to be infested.
Following 10 days of treatment, a veterinarian should re-evaluate the ears.
If repeated treatment is required

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Permethrin 10 mg
Nystatin 100,000 IU
Triamcinolone acetonide 1mg
Neomycin sulphate 3500 IU

WITHDRAWAL PERIOD:

None



10 ml



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

قطرات أوتاتيس موفي



>



Cat



Dog

>

مضاد للطفيليات و البكتيريا والفطريات ومضاد للالتهابات

الخواص العلاجية والإستطبابات:

لعلاج التهاب الأذن الخارجية المختلط الناتج عن البكتيريا والفطريات والطفيليات.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

يجب تنظيف قنوات الأذن الخارجية قبل العلاج.
يجب وضع قنية الأذن بشكل عمودي لضمان دقة الجرعة.
في القطط والكلاب البالغة:
ضع ٥/٣ قطارة (≈ ٠,٣ مل) في كل أذن.
في القطط الصغيرة:
ضع ٥/١ قطارة (≈ ٠,١ مل) في كل أذن.
ذلك قاعدة الأذن برفق لتوزيع الدواء بالتساوي.
تستخدم مرة واحدة يوميًا لمدة ١٠ أيام متتالية.
يجب علاج كلتا الأذنين حتى لو بدا أن إحدهما فقط مصابة.
بعد ١٠ أيام من العلاج، يجب على الطبيب البيطري إعادة تقييم الأذنين.
يمكن التكرار ان دعت الحاجة .

التركيبة :

تحتوي كل ١ مل على:
بيرميثرين ١٠ مجم
نيستاتين ١٠٠٠٠٠ وحدة دولية
أسيتونيد تريامسينولون ١ مجم
كبريتات نيومايسين ٣٥٠٠ وحدة دولية

فترة السحب :

لا يوجد



١٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)