



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

EXODERN



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Oral solution - To treat the mites in poultry and animals

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: For use in drinking water: 0.05 ml of Exodern per kg of body weight (equivalent to 0.5 mg fluralaner) administered twice, 7 days apart. The complete course of treatment must be administered for a full therapeutic effect.

For each day of treatment, medicated water must be freshly prepared.

If another course of treatment is indicated, the interval between two courses of treatment should be at least 3 months.

Sheep , goats and cattle: 1 ml of exodern per 1 kg of body weight.

INDICATION:

Exodern is a highly effective acaricide against poultry mites. It is a potent inhibitor of parts of the arthropod nervous system. It begins to work within four hours of the mites feeding on treated chickens, and subsequently stops egg production by female mites for 15 days after the first dose, disrupting the mite's life cycle.

Exodern used for the treatment of poultry red mites (*Dermanyssus gallinae*) in pullets, chickens for reproduction and layer hens.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

Fluralaner 10 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat and offal: 14 days.

Eggs: None



1000 ml



(below 25° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

إكسوديرن



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

محلول فموي - لعلاج العث في الدواجن والحيوانات

الجرعة وطريقة الاستخدام :

الدواجن: للاستخدام في مياه الشرب: يُعطى ٠,٠٥ مل من إكسوديرن لكل كيلو غرام من وزن الجسم (ما يعادل ٠,٥ ملغم فلورالانير) مرتين، بفاصل ٧ أيام. يجب تناول جرعة العلاج كاملة للحصول على تأثير علاجي كامل.
الاعنام، الماعز والابقار: ١ مل من إكسوديرن لكل كيلو غرام من وزن الجسم. في كل يوم من أيام العلاج، يجب تحضير الماء المعالج حديثاً.
في حال الحاجة إلى جرعة علاجية أخرى، يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين جرعتين عن ٣ أشهر.

الخصائص والاستعمالات:

إكسوديرن مبيدٌ للقراد يتميز بفعاليته العالية ضد العث الذي يصيب الدواجن، وهو مثبّط قويٌّ لأجزاء من الجهاز العصبي للمفصليات، يبدأ مفعوله خلال أربع ساعات من بدء تغذية العث على الدجاج المُعالج وبالتالي يوقف إنتاج البيض من إنثى السوس لمدة ١٥ يومًا بعد أول جرعة مما يؤدي إلى تعطيل دورة حياة العث. يُستخدم إكسوديرن لعلاج عث الدواجن الأحمر (درمانيسوس جاليناي) في الدجاجات الصغيرة، ودجاج التكاثر، والدجاج البياض.

المكونات :

كل ١ مل يحتوي :
فلورالانير ١٠ ملغم

فترة السحب:

اللحوم ومخلفاتها: ١٤ يوم.
البيض: لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من 25° درجة مئوية)