




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## Quinotrim



>



>

## Poultry

### Water Soluble Powder - Safe and Strong Anti Coccidiosis

#### INDICATIONS:

Quinotrim is indicated for use in drinking water only for the treatment of coccidiosis in Chickens and for the treatment of Colisepticemia in Chickens and Turkey

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

The recommended dose is the equivalent of 30 mg combined Trimethoprim and Sulphaquinoxaline per kg body weight daily.

This dose is provided by the following inclusion rates: In drinking water: 28 g per 100 liters. Treatment should be repeated daily for 5 days or until 2 days after symptoms have subsided, but not exceeding 14 days in total.

Make an initial solution Quinotrim at the rate of 28 g powder in 2 liters of cold water. This should be stirred until well dissolved.

The solution should then be added to the poultry drinker or water header tank at approximately the rate of 2 liters to 98 liters of drinking water.

The mixture should be gently stirred until the powder have dissolved.

Quinotrim will retain its potency for 24 hours as a solution in drinking water. It should always be prepared shortly before use

#### CONTRAINDICATIONS:

- Not to be used as combination with other medication (including anti-coccidiostats).
- Not to be used in layer and breeder flocks when birds are in lay.
- Not to be used in turkeys of less than 21 days of age.

#### COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Sulphaquinoxaline (as  
Sulphaquinoxaline sodium) 500 mg  
Trimethoprim 165 mg

#### WITHDRAWAL PERIOD:

Broiler chickens :10 days  
Turkeys : 14 days.



1000 gm



( below 30°C )




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

## كوينوتريم



>



>

Poultry

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد آمن وقوي للكوكسيديا

### الخواص العلاجية والإستطابات:

يوصف كوينوتريم للاستخدام في ماء الشرب فقط لعلاج الكوكسيديا في الدواجن ولعلاج التسمم الكولي في الدجاج والديك الرومي.

### الجرعات وطريقة الاستعمال :

الجرعة الموصى بها تعادل ٣٠ ملغم من تريميثوبريم وسلفاكوينوكزالين لكل كغم وزن حي يوميا، يتم توفير هذه الجرعة من خلال إضافة الكميات التالية:  
في ماء الشرب: ٢٨ غم / ١٠٠ لتر  
يجب تكرار العلاج يوميا لمدة ٥ أيام أو حتى بعد يومين من تلاشي الأعراض ولكن المجموع الكلي لا يتجاوز ١٤ يوم.  
يجب سائل أولي من كوينوتريم بمقدار ٢٨ غم / ٢ لتر ماء بارد. يجب أن يتم تحريكه حتى يذوب بالكامل.  
يجب إضافة السائل على مشارب الطيور أو في خزان المياه الرئيسي بما يقارب ٢ لتر / ٩٨ لتر من مياه الشرب.  
يجب أن يحرك الخليط ببطء حتى الذوبان.  
يتم عمل سائل جديد يوميا كل (٢٤ ساعة) ويجب تحضيره قبل وقت قصير من الإستخدام.

### موانع الإستخدام:

لا يستخدم مع ادوية أخرى (بما يشمل مضادات الكوكسيديا).  
لا يستخدم في قطعان الدجاج البياض والأمهات عند بداية الإنتاج.  
لا يستخدم في الديك الرومي التي تقل أعمارها عن ٢١ يوم.

### التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :

سلفاكوينوكزالين (على شكل سلفاكوينوكزالين صوديوم) ٥٠٠ ملغم  
تري ميثوبريم ١٦٥ ملغم

### فترة السحب :

الدجاج اللحم : ١٠ أيام  
الديك الرومي : ١٤ يوم



١٠٠٠ جرام



( أقل من ٣٠ درجة مئوية )