



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

MOVECOSIN 25%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

INDICATIONS:

Chickens & Turkeys: for the treatment and prevention of chronic respiratory diseases (Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae). Fowl cholera, Pasteurella multocida, Ornithobacterium rhinotracheale.

in calves: it is used for the treatment and prevention of bovine respiratory disease, associated with (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar) or any other pathogen susceptible to tilmicosin.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Chickens and Turkeys (except for layers producing eggs for human consumption): 3 ml per 10 liters of drinking water for 3 consecutive days

(It should be diluted in drinking water then given to poultry at a daily dose of 15-20 mg tilmicosin/kg of body weight in chickens) and (10-27 mg tilmicosin /kg of bodyweight in turkeys for 3 days equivalent to 75 mg tilmicosin per liter of drinking water)

Calves (lactating non ruminating):

Movecosin 25% should be mixed with milk replacer only 1 ml/20 kg of bodyweight twice daily for 3-5 consecutive days, (equivalent to 12.5 mg tilmicosin/kg of bodyweight)

Warning :

Not to be used in laying hens producing table eggs.

Do not use within 14 days before the start of egg production.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Tilmicosin (as tilmicosin phosphate) 250 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Chickens: 12 days

Turkeys: 19 days

Calves : 42 days



240 ml



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

موفي كوسين ٢٥٪



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Pharmaceutical

الخواص العلاجية والإستطابات:

الدجاج والديك الرومي: لعلاج والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة (ميكوبلازما جاليسينكم و ميكوبلازما سينوفي). كوليرا الدواجن ، باسْتوريلا مالتوسيدا ، أورنيثوبكتيريم ، رينوتريكل .

في العجول: يستخدم لعلاج والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي البقري، المرتبطة بـ منهيمها هيملونيك ، باسْتوريلا مالتوسيدا ، مايكوبلازما بوفس ، مايكوبلازما دسبار أو أي مسبب مرضي آخر قابل للتأثر بالتيلميكوسين.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدجاج والديك الرومي (باستثناء البيض المنتج للبيض للاستهلاك البشري): ٣ مل لكل ١٠ لتر من مياه الشرب لمدة ٣ أيام متتالية

(يجب تخفيفه في مياه الشرب ثم إعطائه للدواجن بجرعة يومية ١٥-٢٠ ملجم تيلميكوسين/كجم من وزن الجسم للدجاج) و (١٠-٢٧ ملجم تيلميكوسين/كجم من وزن الجسم للديك الرومي لمدة ٣ أيام أي ما يعادل ٧٥ ملجم تيلميكوسين لكل لتر من مياه الشرب)

العجول (الرضيعة غير المحتر):

يجب خلط موفي كوسين ٢٥٪ مع بديل الحليب فقط ١ مل/٢٠ كجم من وزن الجسم مرتين يوميًا لمدة ٣-٥ أيام متتالية (أي ما يعادل ١٢,٥ ملجم تيلميكوسين/كجم من وزن الجسم)

تنبيهات :

لايستخدم للدجاج المنتج لبيض المائدة .
لا يستخدم خلال ١٤ يوم قبل بدء انتاج البيض

التركيبية :

يحتوي كل ١ مل على:
تيلميكوسين (فوسفات تيلميكوسين) ٢٥٠ مجم

فترة السحب :

الدجاج: ١٢ يومًا
الديك الرومي: ١٩ يومًا
العجول: ٤٢ يومًا



٢٤٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)