



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Move Chloro 50%



Water Soluble Powder - Broad Spectrum Antibiotic

INDICATIONS:

Chlortetracycline is an antibiotic with a variable and broad-spectrum effect. It diffuses rapidly in the body and is eliminated slowly.

In Poultry it is used in infections caused by gram positive and gram negative bacteria (Staphylococcus, Streptococcus, Clostridia, Haemophilus, Klebsiella, E.coli, Pasteurella, Salmonella), Mycoplasma infections (CRD), Avian spirochetes, Actinobacillosis and Chlamydiosis.

In Large Animals (Calves, Lambs, Kids and Foals) it is used for systemic and local infections, respiratory tract infections, bronchitis, bacterial gastroenteritis, urinary tract infections.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1-2 gm/2 liter of drinking water daily for 5 days.

Calves and Foals: 1-2 gm/ 25 kg of body weight divided into two doses and given every 12 hours for 4-5 days.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Chlortetracycline HCl 500 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Treated animals and birds should not be slaughtered during treatment period and within 5 days from the last treatment.



1000 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

موفي كلورو ٥٠ %



Cow



Poultry



Goat



Lamb



Horse



Camel

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف

الخواص العلاجية والإستطبابات:

كلورنتراسيكلين هو مضاد حيوي بتأثير متنوع وواسع الطيف. ينتشر بشكل سريع في الجسم ويتم إخراجها ببطء. في الدواجن يستعمل للعدوى الناتجة عن البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة الجرام (المكورات السحيجة، المكورات العنقودية، الكلوسترديا، الهيموفلس، الكليبيلا، الإي كولا، الباستوريلا، السالمونيلا)، والميكوبلازما (الالتهاب التنفسي المزمن)، زهري الطيور، الفطريات الشعاعية والكلاميديا. في الحيوانات الكبيرة (عجول، حملان، جديان والأمهر) يستعمل للعدوى الجهازية والموضعية، عدوى الجهاز التنفسي، عدوى القصبه الهوائية، عدوى الجهاز الهضمي البكتيرية و عدوى الجهاز البولي

الجرعات وطريقة الاستعمال:

الدواجن: ١-٢ غم لكل ٢ لتر من ماء الشرب يومياً لمدة ٥ أيام.
العجول والأمهر: ١-٢ غم / ٢٥ كغم من وزن الجسم مقسمة على جرعتين تعطى كل ١٢ ساعة لمدة ٤-٥ أيام.

التركيبية:

كل ١ غرام يحتوي:

كلورنتراسيكلين هيدروكلورايد ٥٠٠ ملغم

فترة السحب:

يجب عدم ذبح الطيور والحيوانات المعالجة خلال فترة العلاج ولمدة ٥ أيام من آخر جرعة علاجية.



١٠٠٠ جرام



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)