



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Move Chloro 25%



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb



Horse



Camel

Water Soluble Powder - Broad Spectrum Antibiotic

INDICATIONS:

Chlortetracycline is an antibiotic with a variable and broad-spectrum effect. It diffuses rapidly in the body and is eliminated slowly.

In Poultry it is used in infections caused by gram positive and gram negative bacteria (Staphylococcus, Streptococcus, Clostridia, Haemophilus, Klebsiella, E.coli, Pasteurella, Salmonella), Mycoplasma infections (CRD), Avian spirochetes, Actinobacillosis and Chlamydiosis.

In Large Animals (Calves, Lambs, Kids and Foals) it is used for systemic and local infections, respiratory tract infections, bronchitis, bacterial gastroenteritis, urinary tract infections.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 gm/1 liter of drinking water daily for 5 days.

Calves and Foals: 2 gm/ 25 kg of body weight divided into two doses and given every 12 hours for 4-5 days.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Chlortetracycline HCl 250 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Treated animals and birds should not be slaughtered during treatment period and within 5 days from the last treatment.



1000 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي كلورو ٢٥٪



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

>



Horse



Camel

Pharmaceutical

بودرة قابلة للذوبان في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف

الخواص العلاجية والإستطابات:

كلورنتراسيكلين هو مضاد حيوي بـتأثير متنوع وواسع الطيف. ينتشر بشكل سريع في الجسم ويتم إخراجُه ببطء.
في الدواجن يستعمل للعدوى الناتجة عن البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة الجرام (المكورات السبحية، المكورات العنقودية، الكلوسترديا، الهيموفلس، الكليبيلا، الإي كولاي، الباستوريلا، السالمونيلا)، والميكوبلازما (الالتهاب التنفسي المزمن)، زهري الطيور، الفطريات الشعاعية والكلاميديا.
في الحيوانات الكبيرة (عجل، حملان، جديان والأهمل) يستعمل للعدوى الجهازية والموضعية، عدوى الجهاز التنفسي، عدوى القصبه الهوائية، عدوى الجهاز الهضمي البكتيرية وعدوى الجهاز البولي

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ غم لكل ١ لتر من ماء الشرب يومياً لمدة ٥ أيام.
العجول والأهمل: ٢ غم / ٢٥ كغم من وزن الجسم مقسمة على جرعتين تعطى كل ١٢ ساعة لمدة ٤-٥ أيام.

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :

كلورنتراسيكلين هيدروكلورايد ٢٥٠ ملغم

فترة السحب :

يجب عدم ذبح الطيور والحيوانات المعالجة خلال فترة العلاج ولمدة ٥ أيام من آخر جرعة علاجية.



١٠٠٠ جرام



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)