



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Ciprodern



Cow



Poultry



Goat



Lamb



Rabbit

Pharmaceutical

Broad spectrum antibiotics

INDICATIONS:

Ciprodern contains the antibiotic Ciprofloxacin which is highly effective against Mycoplasma, gram negative bacteria such as; (E.coli, Proteus, Pseudomonas, Salmonella), and gram positive bacteria such as; (Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacteria, Clostridia).

Ciprodern is used for treatment of many infectious diseases in: Poultry:

CRD, Mycoplasma, E.coli, Coryza, Omphalitis, Yolk Sac infection, Salmonellosis and Fowl cholera.

Calves, lambs, kids and rabbits:

Respiratory and urogenital tract infections, diarrhea, enteritis, dysentery, Pasteurellosis and enterotoxaemia.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml/1-2 Lt of drinking water for 3-5 days.

Calves, lambs, kids and rabbits: 1 ml /20 kg b.wt in drinking water for 3-5 days.

COMPOSITION:

Each 1 ml contains:
Ciprofloxacin 100 mg
(as ciprofloxacin lactate)

WITHDRAWAL PERIOD:

Don't use animal products during treatment and within 5 days from the last treatment .



1000 ml



(below 30° C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

جديد

سايبيروديرن



Cow



Poultry



Goat



Lamb



Rabbit

مضاد حيوي واسع الطيف

التركيبة :

يحتوي كل ١ مل على:
سايبيروفلوكساسين ١٠٠ ملغ
على هيئة سايبيروفلوكساسين لاكتات (

فترة السحب :

لا تستخدم المنتجات الحيوانية أثناء العلاج
وخلال ٥ أيام من آخر جرعة

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يحتوي سايبيروديرن على المضاد الحيوي سايبيروفلوكساسين الذي يتميز بفعاليتّه العالية ضد الميكوبلازما والبكتيريا سالبة الجرام مثل: (إي كولاي، بروتوس، سودوموناس، سالمونيلا)، والبكتيريا موجبة الجرام مثل: (ستافيلوكوكس، سترپتوكوكس، كورينيباكتيريا، كلوستريديا).

يستخدم سايبيروديرن لعلاج العديد من الأمراض المعدية في:
الدواجن:

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، الميكوبلازما، إي كولاي، كوريزا، التهاب السرة، عدوى كيس الصفار، السالمونيلا وكوليرا الطيور.

العجول والحملان والصغار والأرانب:

التهابات الجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي، الإسهال، التهاب الأمعاء، الزحار، الباستوريلا والتسمم المعوي.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١ مل/٢-١ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.

العجول والحملان والصغار والأرانب: ١ مل/٢٠ كجم من وزن الجسم في مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)

Pharmaceutical